Modèles en Sciences de la Vie
Chapitre 1
Bioénergétique
Introduction à la bioénergétique et aux types
trophiques

V. Garlatti
virginie.garlatti@univ-tln.fr
Bureau U 025

2023

Définition : Métabolisme : processus global qui assure aux organismes vivants l'apport et l'utilisation de l'énergie libre dont ils ont besoin pour assurer leurs fonctions variées

Enthalpie libre

$$\Delta G = G_{\text{produit}} - G_{\text{reactifs}}$$

La variation d'énergie libre est donc :

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln \frac{[C]^\delta * [D]^\delta}{[A]^\alpha * [B]^\beta} \quad (2)$$

Enthalpie libre

Exercice 1 : Enthalpie libre standard des réactions organiques

1. L'alcool déshydrogénase catalyse la réaction suivante :

La constante d'équilibre K de la réaction à 25 deg C est de $7,19 \cdot 10^9 \text{ mol/L}$.
Calculez ΔG_0 ($R = 8,32 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$).

2. La première étape de glycolyse consiste à dégrader la molécule d'ATP en ADP et P_i afin de placer le P_i sur la carbone 6 du glucose. Calculer l'enthalpie libre de cette réaction sachant que :

Enthalpie libre des réactions redox et équation de Nerst

La variation d'énergie libre est donc :

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln \frac{[A_{red}][B_{ox}^{n+}]}{[A_{ox}^{n+}][B_{red}]} \quad (6)$$

$$\Delta G = -w_{\text{électrique}} = -nF\Delta E \quad (7)$$

Exprimez ΔE

Nombre d'oxydo réduction

- Atome isolé : 0
- Ion simple : valeur algébrique de leur charge
- Molécules et ions complexes : dans un composé covalent le nombre d'oxydation de chaque élément correspond à la charge restant sur l'élément une fois les électrons de liaison attribués à l'atome le plus électronégatif.

Exercice

Exercice 2 : Réactions rédox

1. Soit la réaction suivante : $Cu^{2+} + Fe \leftrightarrow Fe^{2+} + Cu$. Donnez les demi-équations rédox ainsi que nombre d'oxydation de chaque espèce
2. Donnez le nombre d'oxydation des carbones dans le méthane, l'éthane, l'éthylène, l'acétate, l'éthanol, le formol
3. Donner les demi-équations rédox de la réaction suivante :

Rupture de liaison

- ◇ **rupture homolytique** : la paire d'électron de la liaison covalente se partage équitablement entre les deux atomes : on obtient des radicaux qui sont des espèces très réactives. Ceci est classique dans les réactions rédox.
- ◇ **rupture hétérolytique** : la paire d'électron est conservée par l'un des deux atomes. Dans ce cas, on obtient un anion et un cation suite à la rupture.

(VOET et VOET, 2021)

Electrophile versus nucléophile

(a) Nucleophiles

(b) Electrophiles

H^+ **Protons**

M^{n+} **Metal ions**

(VOET et VOET, 2021)

Types de réactions

- ◇ Réactions de transfert de groupe
- ◇ Réaction d'oxydoréduction
- ◇ Réactions d'élimination, d'isomérisation et de réarrangement
- ◇ Formation de liaisons CC

(VOET et VOET, 2021)

Les monnaies d'échange

- ◇ Les NTP : les nucléotides tri-phosphates dont LA molécule fournisseur universelle d'énergie est l'ATP.
- ◇ Les co-enzymes réduits : NADH, NAPH et FADH₂.

(VOET et VOET, 2021)

La molécule d'ATP

Les molécules phosphorylées

Compound	$\Delta G^{0'}$ (kJ · mol ⁻¹)
Phosphoenolpyruvate	-61.9
1,3-Bisphosphoglycerate	-49.4
ATP (↔ AMP + PP_i)	-45.6
Acetyl phosphate	-43.1
Phosphocreatine	-43.1
ATP (↔ ADP + P_i)	-30.5
Glucose-1-phosphate	-20.9
PP _i	-19.2
Fructose-6-phosphate	-13.8
Glucose-6-phosphate	-13.8
Glycerol-3-phosphate	-9.2

Source: Mostly from Jencks, W.P., in Fasman, G.D. (Ed.), *Handbook of Biochemistry and Molecular Biology* (3rd ed.), *Physical and Chemical Data*, Vol. 1, pp. 296-304, CRC Press (1976).

(a) Les $\Delta G^{0'}$ des principales molécules phosphorylées (b) Place de l'ATP au sein des molécules phosphorylées

(VOET et VOET, 2021)

Utilisation ATP dans la cellule

Pas de réserve d'ATP :

- ◇ Concentration stable (+/- 10 %)
- ◇ besoins de la cellule pendant une ou deux minutes

Utilisation de hydrolyse d'ATP :

- ◇ **Réactions métaboliques :**
- ◇ **Voies de signalisation :**
- ◇ **Transports primaires :**
- ◇ **Cytosquelette**

(VOET et VOET, 2021)

Place au niveau des potentiels redox

Half-Reaction	E° (V)
$\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2O$	0.815
$NO_3^- + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons NO_2^- + H_2O$	0.42
Cytochrome $a_3(Fe^{3+}) + e^- \rightleftharpoons$ cytochrome $a_3(Fe^{2+})$	0.385
$O_2(g) + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2O_2$	0.295
Cytochrome $a(Fe^{3+}) + e^- \rightleftharpoons$ cytochrome $a(Fe^{2+})$	0.29
Cytochrome $c(Fe^{3+}) + e^- \rightleftharpoons$ cytochrome $c(Fe^{2+})$	0.235
Cytochrome $c_1(Fe^{3+}) + e^- \rightleftharpoons$ cytochrome $c_1(Fe^{2+})$	0.22
Cytochrome $b(Fe^{3+}) + e^- \rightleftharpoons$ cytochrome $b(Fe^{2+})$ (mitochondrial)	0.077
Ubiquinone + $2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons$ ubiquinol	0.045
Fumarate ⁻ + $2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons$ succinate ⁻	0.031
FAD + $2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons$ FADH ₂ (in flavoproteins)	-0.040
Oxaloacetate ⁻ + $2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons$ malate ⁻	-0.166
Pyruvate ⁻ + $2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons$ lactate ⁻	-0.185
Acetaldehyde + $2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons$ ethanol	-0.197
FAD + $2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons$ FADH ₂ (free coenzyme)	-0.219
S + $2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons$ H ₂ S	-0.23
Lipoic acid + $2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons$ dihydrolipoic acid	-0.29
NAD ⁺ + $H^+ + 2e^- \rightleftharpoons$ NADH	-0.315
NADP ⁺ + $H^+ + 2e^- \rightleftharpoons$ NADPH	-0.320
Cystine + $2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons$ 2 cysteine	-0.340
Acetoacetate ⁻ + $2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons$ β -hydroxybutyrate ⁻	-0.346
$H^+ + e^- \rightleftharpoons \frac{1}{2}H_2$	-0.421
$SO_4^{2-} + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons$ $SO_3^{2-} + H_2O$	-0.454
Acetate ⁻ + $3H^+ + 2e^- \rightleftharpoons$ acetaldehyde + H ₂ O	-0.581

Utilisation des cofacteurs réduits

Il existe trois grands co-facteurs réduits :

- ◇ le NADPH : source d'énergie dans les voies de biosynthèse
- ◇ le NADH : produit lors des voies cataboliques et utilisé par la chaîne respiratoire uniquement. Le trop plein de NADH dans le cytoplasme est absorbé par la fermentation.
- ◇ le FADH₂ : le plus souvent associé avec une enzyme, sert de transporteur d'électron transitoire.

Couplage chimique

Couplage chimique

Couplage chimiosmotique

(c) Réactions redox entraîne gradient H^+ (d) gradient H^+
entraîne synthèse ATP

Figure – Réactions de production d'ATP et de NADH par couplage chimique (2)

Voies métaboliques

Définition : Voie métabolique : série de réactions enzymatiques successives qui forment des produits spécifiques

Définition : Métabolites : substrats, intermédiaires ou produits des voies métaboliques

Définition : Catabolisme : voies métaboliques qui assurent la synthèse d'énergie par la dégradation de métabolites complexes en métabolites simples. C'est un terme utilisé surtout pour les chimioorganotrophes qui utilisent les molécules organiques comme source d'énergie

Définition : Anabolisme : voies métaboliques qui assurent la biosynthèse. L'anabolisme consiste le plus souvent en réactions endergoniques (défavorables) qui sont possibles par couplage avec la dégradation de NTP ou du NADPH

Voies métaboliques

Figure – Lien entre catabolisme et anabolisme

Voies métaboliques

Table 16-1 Metabolic Functions of Eukaryotic Organelles

Organelle	Function
Mitochondrion	Citric acid cycle, electron transport and oxidative phosphorylation, fatty acid oxidation, amino acid breakdown
Cytosol	Glycolysis, pentose phosphate pathway, fatty acid biosynthesis, many reactions of gluconeogenesis
Lysosomes	Enzymatic digestion of cell components and ingested matter
Nucleus	DNA replication and transcription, RNA processing
Golgi apparatus	Post-translational processing of membrane and secretory proteins; formation of plasma membrane and secretory vesicles
Rough endoplasmic reticulum	Synthesis of membrane-bound and secretory proteins
Smooth endoplasmic reticulum	Lipid and steroid biosynthesis
Peroxisomes (glyoxisomes in plants)	Oxidative reactions catalyzed by amino acid oxidases and catalase; glyoxylate cycle reactions in plants

Figure – Répartition des voies dans les organites

Schéma Bilan

Schéma bilan 1 : Principes des échanges d'énergie cellulaire

Faites un schéma bilan sur la production et l'utilisation de l'énergie dans la cellule en incluant les lois de chimie.

Besoins et types trophiques

Figure – Les types trophiques chez les microorganismes (WILLEY et al., 2008)

La phototrophie

PHOTOORGANOTROPHIE	PHOTOLITHOTROPHIE			Donneur électron "faible"
Donneur électron organique	Donneur électron inorganique			Niveau énergétique trop bas pour fournir seul de l'énergie
Molécule organique réduite (SUCCINATE)	Fe (II)	H ₂ S, S ⁰ , H ₂	H ₂ O	réduit
Molécule organique oxydée	Fe (III)	H ₂ S, S ⁰ , H ₂	O ₂	oxydé
Bactéries pourpre non sulfureuses	Photoferrotrophes	Bactéries pourpre sulfureuses	Cyanobactérie	Type micro-organisme
Rhodospirillaceae	<i>Chlorobium Rhodobacter</i>	<i>Thiospirillum</i>	<i>Crocococcus</i>	Exemple (genre)
				Exemple (espèce)
<i>Rhodospirillum rubrum</i>	<i>Chlorobium ferrooxidans</i>	<i>Thiospirillum jenense</i>	<i>Crocococcus turgidus</i>	
Gram-negative, 0,8- 1 μm	Gram-negative, 0,5 x 1,0-15 μm	Gram-negative, 3 x 20 μm	Gram-negative, 20 μm	

La chimolithotrophie

Donneur électron inorganique "fort" Niveau énergétique suffisant pour fournir de l'énergie			
H ₂	H ₂ S, S ²⁻ , thiosulfate	NH ₄ ⁺	NO ₂ ⁻
H ₊	sulfate, sulfites	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻
Archéobactérie Méthano-gène	sulfo-bactéries	Bactéries Nitrifiantes	Bactéries Nitrifiantes
<i>Méthanobacterium</i>	<i>Thiobacillus</i>	<i>Nitrosococcus</i>	<i>Nitrobacter</i>
<i>Méthanobacterium thermoautotrophicum</i> 2.5 µm	<i>Thiobacillus thiophilus</i> gram-negative 1 µm	<i>Nitrosococcus wardiae</i> gram-negative 1 µm	<i>Nitrobacter agilis</i> gram-negative 1 µm

La chimioorganotrophie

Etape 1 : dégradation des molécules organiques complexes en intermédiaires

Donneur électron organique "fort"
Niveau énergétique suffisant pour fournir l'énergie

Etape 2 : Transfert des électrons

Possibilité 1 : Fermentation,
pas de nouvelle production d'énergie
accepteur électron final endogène

Bactéries, champignons

Intermédiaires (2C-3C)
réduit

Possibilité 2 : Respiration

Nouvelle production d'énergie
accepteur électron final exogène

Accepteur d'électron	Respiration aérobie	Exemples de Respiration anaérobie		
oxydé	O ₂	NO ₃ ⁻	SO ₄ (2-)	CO ₂
réduit	H ₂ O	NO ₂ ⁻	H ₂ S	CH ₄
Métabolisme		Dénitrification	Bactérie sulfo-réductrices	Archéobactérie Methanogène
Exemple (genre)		<i>Pseudomonas</i> <i>Champignons</i>	<i>Clostridium</i>	<i>Methanobrevibacter</i>
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i> Gram-négative 2um poumons	<i>Clostridium difficile</i> Gram-positif 10um Intestins	<i>Methanobrevibacter smithii</i> hum Intestin

La chimioorganotrophie

Exercice 3 : Comparaison du rendement énergétique de la respiration aérobie et anaérobie (Coutouly et al., s. d.)

La bactérie dénitrifiante est une bactérie chimio-organotrophe anaérobie stricte. Elle possède néanmoins une chaîne de transporteurs d'électrons lui permettant de respirer avec comme accepteur final d'électron est l'ion nitrate (NO_3^-) qui est réduit en nitrite (NO_2^-). La dégradation des sucres mène à la production de NADH qui alimente la chaîne respiratoire.

1. Écrire l'équation bilan de la chaîne respiratoire
2. Calculer la variation d'enthalpie libre standard
3. Comparer à la variation d'enthalpie de la respiration avec comme accepteur final l'oxygène.

Données : $E'_{0(NADH/NAD^+)} = -0,32V$, $E'_{0(\frac{1}{2}O_2/H_2O)} = 0,81V$,

$E'_{0(NO_3^-/NO_2^-)} = -0,42V$, $F = 96500C$

Auto ou hétérotrophie

Obtention molécules complexes : voies anaboliques métabolismes assimilatifs

Schéma bilan

Schéma bilan 2 : Les types trophiques

Faites un schéma bilan sur les types trophiques

Roches et micro-organismes

Roche	Micro-organisme	processus	date	Image
Pétrole	plancton	sédimentation océanique	20 à 350 millions d'années	
stromatolite	biofilms	précipitation carbonate autour de micro-organismes	3,8 milliards d'années à nos jours	
fer rubané	procaryotes et biofilms	Précipitation de fer autour de cohorte de bactéries feroxidante	Essentiellement avant apparition O ₂ (environ 2.34 milliards d'années) et un peu lors des épisodes de Terre boule de neige (700 et 500 millions d'années)	(ENS lyon)
Calcaire oolithique	Micro-organisme planctonique et biofilms	Sédimentation de plateforme continentale	jusqu'à aujourd'hui	

Disponibilité des macro-éléments dans l'environnement

Table 27.1		The Major Forms of Carbon, Nitrogen, Sulfur, and Iron Important in Biogeochemical Cycling				
Cycle	Significant Gaseous Component Present?	Major Forms and Valences				
		Reduced Forms	Intermediate Oxidation State Forms		Oxidized Forms	
C	Yes	Methane: CH ₄ (-4)	Carbon monoxide CO (+2)		CO ₂ (+4)	
N	Yes	Ammonium: NH ₄ ⁺ , organic N (-3)	Nitrogen gas: N ₂ (0)	Nitrous oxide N ₂ O (+1)	Nitrite: NO ₂ ⁻ (+3)	Nitrate: NO ₃ ⁻ (+5)
S	Yes	Hydrogen sulfide: H ₂ S, SH groups in organic matter (-2)	Elemental sulfur: S ⁰ (0)	Thiosulfate: S ₂ O ₃ ²⁻ (+2)	Sulfite: SO ₃ ²⁻ (+4)	Sulfate: SO ₄ ²⁻ (+6)
Fe	No	Ferrous iron: Fe ²⁺ (+2)				Ferric Iron: Fe ³⁺ (+3)

Note: The carbon, nitrogen, and sulfur cycles have significant gaseous components, and these are described as gaseous nutrient cycles. The iron cycle does not have a gaseous component, and this is described as a sedimentary nutrient cycle. Major reduced, intermediate oxidation state, and oxidized forms are noted, together with valences.

Figure – Les formes inorganiques des macro-éléments selon leur degré d'oxydation (WILLEY et al., 2008)

cycle du carbone

(WILLEY et al., 2008)

Décomposition de la matière organique

Table 27.2 Complex Organic substrate Characteristics That Influence Decomposition and Degradability

Substrate	Basic Subunit	Linkages (if Critical)	Elements Present in Large Quantity					Degradation	
			C	H	O	N	P	With O ₂	Without O ₂
Starch	Glucose	$\alpha(1\rightarrow4)$ $\alpha(1\rightarrow6)$	+	+	+	-	-	+	+
Cellulose	Glucose	$\beta(1\rightarrow4)$	+	+	+	-	-	+	+
Hemicellulose	C6 and C5 monosaccharides	$\beta(1\rightarrow4)$, $\beta(1\rightarrow3)$, $\beta(1\rightarrow6)$	+	+	+	-	-	+	+
Lignin	Phenylpropene	C-C, C-O bonds	+	+	+	-	-	+	-
Chitin	<i>N</i> -acetylglucosamine	$\beta(1\rightarrow4)$	+	+	+	+	-	+	+
Protein	Amino acids	Peptide bonds	+	+	+	+	-	+	+
Hydrocarbon	Aliphatic, cyclic, aromatic		+	+	-	-	-	+	+ / -
Lipids	Glycerol, fatty acids; some contain phosphate and nitrogen	Esters, ethers	+	+	+	+	+	+	+
Microbial biomass		Varied	+	+	+	+	+	+	+
Nucleic acids	Purine and pyrimidine bases, sugars, phosphate	Phosphodiester and <i>N</i> -glycosidic bonds	+	+	+	+	+	+	+

(WILLEY et al., 2008)

cycle de l'azote

(WILLEY et al., 2008)

le cycle du phosphate

le cycle du soufre

le cycle du Fer

le cycle du Manganèse

Toxicité des métaux

Table 27.3 Examples of Microorganism-Metal Interactions and Relations to Effects on Microorganisms and Homeothermic Animals

Metal Group	Metal	Interactions and Transformations		
		Microorganisms	Homeothermic Animals	
Noble metals	Ag Au Pt	Silver Gold Platinum	Microorganisms can reduce ionic forms to the elemental state. Low levels of ionized metals released to the environment have antimicrobial activity.	Many of these metals can be reduced to elemental forms and do not tend to cross the blood-brain barrier. Silver reduction can lead to inert deposits in the skin.
Metals that form stable carbon metal bonds	As Hg Se	Arsenic Mercury Selenium	Microorganisms can transform inorganic and organic forms to methylated forms, some of which tend to bioaccumulate in higher trophic levels.	Methylated forms of some metals can cross the blood-brain barrier, resulting in neurological effects or death.
Other metals	Cu Zn Co	Copper Zinc Cobalt	In the ionized form, at higher concentrations, these metals can directly inhibit microorganisms. They are often required at lower concentrations as trace elements.	At higher levels, clearance from higher organisms occurs by reaction with plasma proteins and other mechanisms. Many of these metals serve as trace elements at lower concentrations.

Réseaux trophiques

Figure 27.9 The Mercury Cycle. Interactions between the atmosphere, oxic water, and anoxic sediment are critical. Microorganisms in anoxic sediments, primarily *Desulfovibrio*, can transform mercury to methylated forms that can be transported to water and the atmosphere. These methylated forms also undergo biomagnification. The production of volatile elemental mercury (Hg^0) releases this metal to waters and the atmosphere. Sulfide, if present in the anoxic sediment, can react with ionic mercury to produce less soluble HgS .

- ◇ Formation de la matière organique (producteurs primaires).
- ◇ Décomposer la matière organique (décomposeurs).
- ◇ Servir de source de nourriture
- ◇ Modifier les substrats et les nutriments
- ◇ Changer les taux de matière sous forme solide et gazeuse
- ◇ Produire des composés qui inhibent la croissance, l'activité ou la survie des autres espèces.
- ◇ Contribuer au fonctionnement des plantes et des animaux par des interactions positives ou négatives.

Table 27.4		
Characteristics of Extreme Environments in Which Microorganisms Grow		
Stress	Environmental Conditions	Microorganisms Observed
High temperature	121°C	<i>Geogemma barossii</i>
	110–113°C, deep marine trenches	<i>Pyrolobus fumarii</i> <i>Methanopyrus kandleri</i> <i>Pyrodictium abyssi</i>
	67–102°C, marine basins	<i>Pyrococcus abyssi</i>
	85°C, hot springs	<i>Thermus Sulfolobus</i>
	75°C, sulfur hot springs	<i>Thermothrix thiopara</i>
Low temperature	–12°C, antarctic ice	<i>Psychromonas ingrahamii</i>
Osmotic stress	13–15% NaCl	<i>Chlamydomonas</i>
	25% NaCl	<i>Halobacterium</i> <i>Halococcus</i>
pH	pH 10.0 or above	<i>Bacillus</i>
	pH 3.0 or lower	<i>Saccharomyces</i> <i>Thiobacillus</i>
	pH 0.5	<i>Picrophilus oshimae</i>
	pH 0.0	<i>Ferroplasma acidarmanus</i>
Low water availability	$a_w = 0.6–0.65$	<i>Torulopsis</i> <i>Candida</i>
Temperature and low pH	85°C, pH 1.0	<i>Cyanidium Sulfolobus acidocaldarium</i>
Pressure	500–1,035 atm	<i>Colwellia hadaliensis</i>

Schéma bilan

Schéma bilan 3 : Les types trophiques et place dans l'environnement

Dans le cycle du carbone et le cycle de l'azote et replacez les types trophiques responsables des passages d'une forme moléculaire à l'autre.

Références

- COUTOULY, G et al. (s. d.). *Travaux dirigés de biochimie, biologie moléculaire et bioinformatique*. fre. 4e éd. Biosciences et techniques. Rueil-Malmaison : Doin. ISBN : 978-2-7040-1354-8.
- VOET, Donald et Judith G. VOET (2021). *Biochemistry : international adaption*. eng. Fourth edition. New York, NY : Wiley. ISBN : 978-1-119-77064-0.
- WILLEY, Joanne M. et al. (2008). *Prescott, Harley, and Klein's microbiology*. 7th ed. OCLC : ocm71044581. New York : McGraw-Hill Higher Education. ISBN : 978-0-07-299291-5 978-0-07-330208-9.