



BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

Ressource R1-04 : OUTILS MATHEMATIQUES ET LOGICIELS

**Chapitre 3 : Fonctions numériques à variable réelle.
Signaux du GEII**



Enseignante : **Sylvia Le Beux**
sylvia.lebeux@univ-tln.fr
Bureau E211 - 04 94 14 21 15

Table des matières

Partie A : Etude d'une fonction	5
Partie B : Calcul de limites	26
Partie C : Fonctions réciproque des fonctions exp et tan	34
Partie D : Exercices	39
Partie E : Exercices d'entraînement pour les poursuites d'études longues	41

Notes

Partie A : Etude d'une fonction


I. Notions de base

1) Définitions et notations

Une fonction f , est définie sur D , un sous-ensemble de \mathbb{R} , si à tout x de D on peut associer un unique nombre noté $f(x)$, et appelé **image** de x par f .

On écrit $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto f(x)$

D est appelé l'ensemble de définition de f , on le note aussi D_f .



On munit le plan d'un repère (O, \vec{i}, \vec{j}).
La courbe C représentant f est l'ensemble des points M de coordonnées $M(x, f(x))$.


$$\overrightarrow{OM} = x \vec{i} + f(x) \vec{j}$$






$y = f(x)$ est l'équation cartésienne de f .

Une fonction peut être obtenue à partir d'une formule (signal déterministe), d'un tableau de valeurs relevé d'expériences physiques (signal numérique), ou bien d'une courbe.

2) Croissance comparée et fonctions usuelles

Pour des grandes valeurs positives de x : $\ln(x) < \sqrt[3]{x} < \sqrt{x} < x < x^2 < x^3 < \dots < x^n < e^x$



<u>Echelon-unité</u> : (Heaviside Φ) $U : \mathbb{R} \longrightarrow \{0, 1\}$ $x \longmapsto U(x)$ avec $U(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$		Ensemble de définition : \mathbb{R} Ensemble image : $U(\mathbb{R}) = \{0, 1\}$ On dit que la fonction U est continue sur \mathbb{R} , sauf en 0. $\lim_{x \rightarrow 0^-} U(x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} U(x) = 1$
<u>Triangle</u> : (notée aussi tri) $\Delta : \mathbb{R} \longrightarrow [0 ; 1]$ $x \longmapsto \Delta(x)$ $\Delta(x) = \begin{cases} 1 - x & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$		Ensemble de définition : \mathbb{R} Ensemble image : $[0 ; 1]$ On dit que la fonction triangle est continue sur \mathbb{R} .
<u>Puissance impaire</u> : $n \in \mathbb{N}$ $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ $x \longmapsto f(x) = x^{2n+1}$		Ensemble de définition : \mathbb{R} Ensemble image : \mathbb{R} On dit que la fonction f est continue sur \mathbb{R} . $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
<u>Puissance paire</u> : $n \in \mathbb{N}$ $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+$ $x \longmapsto f(x) = x^{2n}$		Ensemble de définition : \mathbb{R} Ensemble image : $\mathbb{R}_+ = [0 ; +\infty[$ On dit que la fonction f est continue sur \mathbb{R} . $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
<u>Racine carrée</u> : $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$ $x \longmapsto f(x) = \sqrt{x}$		Ensemble de définition : \mathbb{R}_+ Ensemble image : \mathbb{R}_+ On dit que la fonction f est continue sur \mathbb{R}_+ . $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

<u>Racine cubique</u> : $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto f(x) = \sqrt[3]{x}$		Ensemble de définition : \mathbb{R} Ensemble image : \mathbb{R} On dit que la fonction f est continue sur \mathbb{R} . $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
<u>Inverse</u> : $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ $x \mapsto f(x) = 1/x$		Ensemble de définition : \mathbb{R}^* Ensemble image : \mathbb{R}^* f est continue sur $]0; +\infty[$ f est continue sur $]-\infty; 0[$ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$
<u>Valeur absolue</u> : $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ $x \mapsto f(x) = x $		Ensemble de définition : \mathbb{R} Ensemble image : \mathbb{R}_+ f est continue sur \mathbb{R} . $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
<u>Exponentielle</u> : $f: \mathbb{R} \rightarrow]0; +\infty[$ $x \mapsto f(x) = e^x$ $e^0 = 1$ $e^{a+b} = e^a \times e^b$; $(e^a)^n = e^{a.n}$ $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$; $e^{-b} = \frac{1}{e^b}$		Ensemble de définition : \mathbb{R} Ensemble image : $]0; +\infty[= \mathbb{R}_+^*$ f est continue sur \mathbb{R} . $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
<u>Logarithme népérien</u> : $f:]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto f(x) = \ln(x)$ $\ln(1) = 0$; $\ln(e) = 1$ $\ln(a.b) = \ln(a) + \ln(b)$ $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$ $\ln(a^n) = n \ln(a)$		Ensemble de définition : \mathbb{R}_+^* Ensemble image : \mathbb{R} f est continue sur \mathbb{R}_+^* $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

II. Ensemble de définition et ensemble d'étude d'une fonction**1) Ensemble de définition**

Soit f , une fonction. L'ensemble de définition de f est l'ensemble des nombres réels x , pour lesquels $f(x)$ existe.

Rappel des opérations impossibles division par zéro, racine carrée d'un nombre négatif, logarithme d'un nombre négatif ou nul, autrement dit :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* \xrightarrow{\quad} \mathbb{R} & [0; +\infty[\xrightarrow{\quad} \mathbb{R} &]0; +\infty[\xrightarrow{\quad} \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{x} & x \mapsto \sqrt{x} & x \mapsto \ln(x) \end{array}$$

Exemples

✓ Soit $f(x) = \frac{x^2-1}{x+3}$, déterminer l'ensemble de définition de f

.....

.....

.....

.....

.....

.....

✓ Soit $g(x) = \exp\left(\frac{x^2-1}{x+3}\right)$, déterminer l'ensemble de définition de g

.....

.....

.....

✓ Soit $h(x) = \ln\left(\frac{x^2-1}{x+3}\right)$, déterminer l'ensemble de définition de h

.....

.....

.....


Notes

- ✓ Soit $k(x) = \sqrt{\frac{x^2-1}{x+3}}$, déterminer l'ensemble de définition de k


2) Parité

- ✓ Une fonction f , définie sur D , un sous-ensemble de \mathbb{R} centré en 0, est dite **paire** lorsque : $\forall x \in D \quad f(-x) = f(x)$. Sa représentation graphique est alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On étudie alors f sur $D \cap \mathbb{R}_+$
- ✓ Une fonction f , définie sur D , un sous-ensemble de \mathbb{R} centré en 0, est dite **impaire** lorsque : $\forall x \in D \quad f(-x) = -f(x)$. Sa représentation graphique est alors symétrique par rapport à l'origine du repère. On étudie alors f sur $D \cap \mathbb{R}_+$

f est paire :



f est impaire :



Exemples

- ✓ La fonction cosinus $x \mapsto x^2$ est paire sur \mathbb{R} , les fonctions sinus et $x \mapsto x^3$ sont impaires sur \mathbb{R} . La fonction tangente est impaire sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\}$.
 - ✓ Soit f , la fonction définie par : $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$, étudier la parité de f .
-
-
-

- ✓ Soit g , la fonction définie par : $g(x) = \sin(x) - \sin(3x)$, étudier la parité de g .
-
-
-

- ✓ On appelle sinus hyperbolique, la fonction définie par : $\text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ étudier la parité de sh .
-
-
-

Opérations

- ✓ Si f et g sont paires sur D , alors $f \times g$ (et f/g $g \neq 0$) est paire sur D
- ✓ Si f et g sont impaires sur D , alors $f \times g$ (et f/g $g \neq 0$) est paire sur D
- ✓ Si f est impaire et g est paire sur D , alors $f \times g$ (et f/g $g \neq 0$) est impaire sur D

Exemple

Soit f , la fonction, définie par : $f(x) = \frac{x^3 \cdot \sin^2(x)}{\cos(x)}$ sur $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\}$ Etudier la parité de f .

.....

.....

.....


3) Périodicité

Une fonction f , définie sur D , un sous-ensemble de \mathbb{R} , est dite **périodique** lorsqu'il existe un nombre réel positif, T , le plus petit possible tel que :

$\forall x \in D \quad f(x + T) = f(x)$. On dit aussi que f est **T-périodique**.

Soit f_0 , la fonction définie par : $f_0(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in [x_0, x_0 + T[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$. f_0 est appelée le **motif de la fonction f** .

La représentation graphique de f est obtenue en appliquant sur la courbe représentant f_0 , les translations de vecteur $kT\vec{i}$ où k est un entier relatif. On étudie alors la fonction f sur l'intervalle $[x_0, x_0 + T[$.





Remarque On peut alors écrire : (voir TP)

$$f(t) = \dots + f_0(t + 2T) + f_0(t + T) + f_0(t) + f_0(t - T) + f_0(t - 2T) + \dots = \sum_{-\infty}^{\infty} f_0(t - kT)$$

Exemples

- ✓ Les fonctions $t \mapsto \cos(\omega t + \varphi)$ et $t \mapsto \sin(\omega t + \varphi)$ sont $\frac{2\pi}{\omega}$ - périodiques. La fonction $t \mapsto \tan(\omega t + \varphi)$ est $\frac{\pi}{\omega}$ - périodique sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\}$
 - ✓ Soit g , la fonction définie par : $g(x) = \sin(x) - \sin(3x)$, étudier la périodicité de g .
-
-
-



Notes

III. Dérivabilité

1) Définitions et opérations

Soit f , une fonction définie en a , on dit que f est dérivable en a lorsque : la limite suivante $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie. On la note alors $f'(a)$ et on l'appelle nombre dérivé de f en a .

Soit f , une fonction définie sur I un intervalle de \mathbb{R} , on dit que f est dérivable sur I , lorsque f est dérivable en tout point a de I . On appelle alors fonction dérivée de f et on note f' , la fonction qui à tout élément a de I , associe son nombre dérivé $f'(a)$.

Si f et g sont dériviales sur I , alors : αf , $f+g$, $f \times g$ et f/g (avec $g \neq 0$) sont dériviales sur I . (α est un nombre réel) et $(\alpha f)' = \alpha f'$, $(f + g)' = f' + g'$, $(fg)' = f'g + fg'$ et $(f/g)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.

Si f est dérivable sur I et g est dérivable sur $f(I)$, alors $g \circ f$ est dérivable sur I et : $(g \circ f)' = (g' \circ f) \times f'$

Exemples

✓ Soit f , la fonction définie par : $f(x) = x^2$.

Dérivabilité de f en 3 :

.....
.....
.....
.....
.....

Dérivabilité de f en a , réel quelconque :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Notes

2) Formulaire U est une fonction dérivable sur I.

$(x^n)' = n \cdot x^{n-1} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} - \{1\}$	$(U^n)' = n \cdot U' \cdot U^{n-1} \quad , \quad U(I) \subseteq \mathbb{R}$
$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^* =]0; +\infty[$	$(\sqrt{U})' = \frac{U'}{2\sqrt{U}} \quad , \quad U(I) \subseteq \mathbb{R}_+^*$
$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}^*$	$\left(\frac{1}{U}\right)' = -\frac{U'}{U^2} \quad , \quad U(I) \subseteq \mathbb{R}^*$
$(e^x)' = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$	$(e^U)' = U' \cdot e^U \quad , \quad U(I) \subseteq \mathbb{R}$
$(\ln(x))' = \frac{1}{x} \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^*$	$(\ln(U))' = \frac{U'}{U} \quad , \quad U(I) \subseteq \mathbb{R}_+^*$
$(\sin(x))' = \cos(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$	$(\sin(U))' = U' \cdot \cos(U) \quad , \quad U(I) \subseteq \mathbb{R}$
$(\cos(x))' = -\sin(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$	$(\cos(U))' = -U' \cdot \sin(U) \quad , \quad U(I) \subseteq \mathbb{R}$
$(\tan(x))' = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$ $\forall x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ où } k \in \mathbb{Z} \right\}$	$(\tan(U))' = \frac{U'}{\cos^2(U)} = (1 + \tan^2(U)) \cdot U'$ $U(I) \subseteq \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ où } k \in \mathbb{Z} \right\}$

Exemples

✓ $f(x) = (2x - 3) \cdot \cos x$

$D_f = \dots$

$f'(x) = \dots$

$D_{f'} = \dots$

✓ $g(x) = \frac{\sin x}{x}$

$D_g = \dots$

$g'(x) = \dots$

.....
D_g =

✓ $i(t) = V_{eff} \sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

D_i =

$i'(t) = \dots$

.....
.....
.....
.....
.....

D_{i'} =

.....
.....
.....
.....
.....

✓ $h(t) = (t^2 + 5)^{10}$

D_h =

$h'(t) = \dots$


.....
.....

D_{h'} =

✓ A l'aide de la définition du nombre dérivé du sinus en 0, calculer : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t}$

.....
.....
.....
.....
.....

Interprétation graphique



$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ est la pente de la droite (AM)

Lorsque x tend vers a , M tend vers A le long de la courbe, et la droite (AM) se rapproche de la droite T_a , qui est la tangente à la courbe au point A .

Conclusion :

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$ est la pente de la tangente à la courbe au point A(a, f(a)).


Conséquence Equation de la tangente T_a

$$T_a : y = f(a) + (x - a) \cdot f'(a)$$


Remarque Graphiquement, une fonction est dérivable en a si et seulement si sa courbe admet au point $A(a ; f(a))$ une tangente.

Exemples


- ✓ Equation de la tangente en O à la courbe représentant la fonction f définie par : $f(x) = x^3$



- ✓ Equation de la tangente en O à la courbe représentant la fonction f définie par : $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$



- ✓ La fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0.



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \dots$$


En O, la tangente à la courbe est donc verticale tournée vers les ordonnées positives.

- ✓ Redressement double alternance : $V(t) = |\sin(t)|$.

Dérivabilité de V en 0 :

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

- ✓ U , la fonction échelon-unité définie et représentée ci-dessous est-elle dérivable sur son ensemble de définition ?

$$U(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t \geq 0 \end{cases}.$$



.....

.....

.....

.....

3) Sens de variation

Soit f , une fonction dérivable sur un intervalle I :

Si $f' \geq 0$, f est croissante sur I

Si $f' \leq 0$, f est décroissante sur I


4) Extremum d'une fonction

Définitions :

- Une fonction f admet un **maximum** en x_0 sur un intervalle I où elle est définie, si pour tout x de I , on a : $f(x) \leq f(x_0)$

- Une fonction f admet un **minimum** en a sur un intervalle I où elle est définie, si pour tout x de I , on a : $f(x) \geq f(x_0)$

Théorème : Si une fonction f est dérivable sur un intervalle I contenant x_0 et si f' s'annule en x_0 en changeant de signe alors la fonction f présente un extremum en x_0 .




Remarque Si f' s'annule en x_0 sans changer de signe, et que f'' s'annule en x_0 en changeant de signe, alors x_0 est un **point d'inflexion**. Un point d'inflexion est un point où la tangente traverse la courbe.

Exemple : $f(x) = x^3$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ f'(0) &= 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= 6x \geq 0 \quad \forall x \geq 0 \\ f''(x) &= 6x \leq 0 \quad \forall x \leq 0 \\ f''(0) &= 0 \end{aligned}$$

O est donc un point d'inflexion, comme on peut le voir sur la représentation ci-contre.



5) Théorème de monotonie

Théorème de monotonie Si f est continue* et strictement monotone sur $[a,b]$ et si $f(a) \times f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ possède une seule et unique solution $\alpha \in [a,b]$

6) Dérivées successives – Fonction de classe C^n

Définitions Si f est continue sur l'intervalle I , on note : $f \in C^0(I)$

Si f est dérivable sur l'intervalle I , et si $f' \in C^0(I)$, alors on note : $f \in C^1(I)$

Si f' est dérivable sur I , alors on note $f'' = (f')'$ que l'on appelle dérivée seconde de f . Si de plus $f'' \in C^0(I)$, alors on note $f \in C^2(I)$

Plus généralement on définit la dérivée $n^{\text{ième}}$ de f , notée $f^{(n)}$. Lorsque $f^{(n)} \in C^0(I)$, on note $f \in C^n(I)$.

Exemple

$$i(t) = \cos(\omega t + \varphi)$$

$$i'(t) = \dots$$

$$i''(t) = \dots$$

$$i''(t) + \omega^2 i(t) = \dots$$

On dit que i est une solution de l'équation différentielle : $y''(t) + \omega^2 y(t) = 0$.

IV. Limites et branches infinies (Calcul de limites voir partie B)

Voir page ci-après.

V. Plan d'étude d'une fonction

- 1) Recherche de l'ensemble de définition
- 2) Recherche de l'ensemble d'étude (parité et de périodicité)
- 3) Etude du sens de variation et recherche d'extrema
- 4) Etude de branches infinies (calcul de limites voir partie C)
- 5) Tracé de la courbe représentative

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

Etude de branches infinies : asymptotes et direction asymptotique.


Notes

Partie B : Calcul de limites**Formes indéterminées FI**

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty$$

$$0^0, \infty^0, 1^\infty$$

Remarque Soit x_0 , un nombre réel ou $\pm\infty$. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \exp(g(x) \cdot \ln(f(x)))$ cette écriture permet de « lever » les formes indéterminées suivantes : "L[∞]", "0⁰" et " ∞^0 "

Voici quelques techniques permettant de « lever » une forme indéterminée :

Technique 1 : Croissance comparée

Définition Soit x_0 un réel ou $\pm\infty$. On dit que la fonction f est négligeable devant la fonction g en x_0 lorsque : $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. On note alors : $f(x) \ll_{x_0} g(x)$

Théorèmes Soient : $0 < \alpha < \beta$

$$\ln(x) \ll_{\infty} x^\alpha \ll_{\infty} x^\beta \ll_{\infty} e^x$$

Exemples : Calculer $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ où $f(x) = x \cdot e^x - x^2$

.....

.....

.....

Calculer $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ où $f(x) = \frac{\ln(4x)}{x}$

.....

.....

Technique 2 : Expression conjuguée

Exemples : Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ où $f(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x}$

.....

.....

.....

.....

Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ où $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 3x - 3} - x}{x - 1}$

.....

.....

.....

.....

Technique 3 : Théorèmes de comparaison

Soient f , g et h trois fonctions définies sur $[a, b]$ où b est un réel ou $\pm\infty$

- 1) Si $\forall x \in [a, b] \quad f(x) \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = -\infty$
- 2) Si $\forall x \in [a, b] \quad f(x) \geq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = \infty$, alors $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \infty$
- 3) Si $\forall x \in [a, b] \quad |f(x)| \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = 0$
- 4) Si $\forall x \in [a, b] \quad h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow b} h(x) = \lim_{x \rightarrow b} g(x) = L$, alors $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = L$ (théorème des gendarmes)

Exemples : Calculer $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ où $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

.....

.....

.....

Notes

Technique 4 : Equivalence

Définition Soit x_0 un réel ou $\pm\infty$. On dit que la fonction f est équivalente à la fonction g en x_0 lorsque : $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$. On note alors : $f(x) \sim_{x_0} g(x)$

Exemples : Montrer que les fonctions f et g suivantes sont équivalentes en ∞ :

$$f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \text{ et } g(x) = \frac{e^x}{2} :$$

.....

.....

.....

Chercher un équivalent de f en ∞ où $f(x) = 7x^3 - 3x^2 + 2$

.....

.....

.....

Tout polynôme est équivalent en $\pm\infty$ à son terme de plus haut degré.
Tout polynôme est équivalent en 0 à son terme de plus bas degré.

Si f est dérivable en x_0 , alors : $f(x) \sim_{x_0} f(x_0) + (x - x_0) \cdot f'(x_0)$

Compléter :

$$\sin(x) \sim_0 \dots$$

$$e^x \sim_0 \dots$$

$$\ln(1+x) \sim_0 \dots$$

$$\sqrt{1+x} \sim_0 \dots$$

.....

$$(1+x)^\alpha \underset{0}{\sim} \dots$$

$$\tan(x) \underset{0}{\sim} \dots$$

Si f est 2 fois dérivable en x_0 , alors : $f(x) \sim_{x_0} f(x_0) + (x - x_0).f'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2}.f''(x_0)$

$$\cos(x) \sim \dots$$

$$\text{Si } f \text{ est } n \text{ fois dérivable en } x_0, \text{ alors :}$$

$$f(x) \underset{x_0}{\sim} f(x_0) + (x - x_0) \cdot f'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2} \cdot f''(x_0) + \frac{(x - x_0)^3}{3!} \cdot f^{(3)}(x_0) + \dots + \frac{(x - x_0)^n}{n!} \cdot f^{(n)}(x_0)$$

Opérations

- Soient f_1, g_1, f_2, g_2 quatre fonctions et x_0 un réel ou $\pm\infty$.

$$\text{Si} \begin{cases} f_1 \underset{x_0}{\sim} g_1 \\ \text{et} \\ f_2 \underset{x_0}{\sim} g_2 \end{cases} \text{ alors } \begin{cases} f_1 \cdot f_2 \underset{x_0}{\sim} g_1 \cdot g_2 \\ \text{et} \\ \frac{f_1}{f_2} \underset{x_0}{\sim} \frac{g_1}{g_2} \end{cases}$$

(pour le quotient, f_2 et g_2 ne s'annule pas pour x voisin de x_0 sauf peut-être en x_0)

- f , g , h sont trois fonctions,

Si $f(X) \sim g(X)$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = X_0$, alors $f(h(x)) \sim g(h(x))$

Exemples :

$$\text{Compléter : } f(x) = \frac{-x^7 + 3x^2}{x(x-1)^3} \sim \dots$$

$$e^{\sqrt{x}} \underset{0}{\sim} \dots$$

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \underset{\infty}{\sim} \dots$$

Théorème Soient f, g deux fonctions et x_0 un réel ou $\pm\infty$.

Si $f(x) \sim g(x)$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$

Exemples : Calculer $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ où $f(x) = \frac{(1-x)^7 \cdot (x+1)}{(x^3 + 2x^2 - 1) \cdot (3x^2 - 1)^2}$

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ où $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{\tan(x)}$

Calculer $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ où $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

.....

Technique 5 : Théorème de l'Hospital

Si f et g sont deux fonctions dérivables sur $]a, x_0[$, dont la limite en x_0 est nulle ou infinie, si $g'(x)$ ne s'annule pas sur $]a, x_0[$, et si la limite : $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Exemples :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x^2 + 3x} = \dots$$

.....

(autre méthode :)

.....)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{\ln(x)} = \dots$$

.....

(autre méthode :)

.....)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) - 1}{x^3 + 5x^2} = \dots$$

(autre méthode :
.....)

Partie C : Fonctions réciproques de exp et tan**Introduction**

Une fonction f est définie sur D , un sous-ensemble de \mathbb{R} , si à tout x de D on peut associer un unique nombre noté $f(x)$, et appelé image de x par f .

On écrit $f : D \longrightarrow f(D)$
 $x \longmapsto y = f(x)$

D est appelé l'ensemble de définition de f , et $f(D)$ l'ensemble image de D par f .

Peut-on déduire de f une fonction g , définie de la façon suivante ?

$$g : f(D) \longrightarrow D$$

$$y \longmapsto x / y = f(x)$$

La réponse est oui, à condition que la fonction f soit bijective sur D .

I. Fonction bijective**1) Définition**

On appelle fonction bijective sur D , toute fonction $f : D \longrightarrow f(D)$
 $x \longmapsto y = f(x)$

vérifiant : $\forall y \in f(D) \ \exists ! \ x \in D / y = f(x)$, c'est-à-dire :

« Pour tout y , élément de $f(D)$, il existe un unique x , élément de D tel que $y=f(x)$ »

Exemples

✓ La fonction carré est-elle bijective sur \mathbb{R} ? sur $[0 ; +\infty[$?

.....

.....

.....

✓ Déterminer un intervalle sur lequel la fonction tangente est bijective.

.....

.....

.....

2) Théorème

Toute fonction continue et strictement monotone sur D est bijective sur D .

Exemple La fonction exponentielle est-elle bijective sur son ensemble de définition ? Pourquoi ?

II. Fonction réciproque

1) Définition

Définition/Théorème Soit une fonction bijective $f : D \xrightarrow{\quad} f(D)$
 $x \mapsto y = f(x)$

il existe alors une fonction notée f^{-1} et appelée « fonction réciproque de f »,
 telle que : $f^{-1} : f(D) \xrightarrow{\hspace{1cm}} D$
 $y \longmapsto x = f^{-1}(y)$

Remarques : $\forall x \in D, (f^{-1} \circ f)(x) = x$ et $\forall y \in f(D), (f \circ f^{-1})(y) = y$

Les courbes représentant f et f^{-1} sont symétriques l'une de l'autre par rapport à la droite $y = x$.

Exemple Déterminer et représenter graphiquement les fonctions réciproque des fonctions exponentielle et tangente restreinte à l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$, ainsi que leur dérivée respective.

En résumé

On appelle fonction tangente restreinte à l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right[$, la fonction définie par :

$$\tan : \left]-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right[\longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto y = \tan(x)$$

Cette fonction est strictement croissante et continue, elle est donc bijective et admet alors une fonction réciproque notée Arctan et appelée Arctangente, définie par :

$$\text{Arctan} : \mathbb{R} \longrightarrow \left]-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right[$$


$$y \longmapsto x = \text{Arctan}(y) \text{ tel que } y = \tan(x)$$

Arctan est une fonction continue et strictement croissante.

$$\tan(\text{Arctan}(x)) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{Arctan}(\tan(x)) = x \quad \forall x \in \left]-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right[$$

$$\frac{d}{dx}(\text{Arctan}(x)) = \frac{1}{1+x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$



Exercices

Exercice 1 Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son ensemble de définition, calculer sa fonction dérivée et son ensemble de définition :


$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 1 ; \quad f(x) = x + \frac{1}{x} \text{ avec } x \neq 0 ; \quad g(t) = \frac{t+1}{t-1} \text{ avec } t \neq 1 ;$$

$$h(t) = \sqrt{t^2 + 1} ; \quad l(\omega) = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + 1}} ; \quad X(\omega) = \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2 ; \quad Z(\omega) = \sqrt{R^2 + L^2\omega^2} ;$$

$$i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi) ; \quad f_0(C) = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} ; \quad W(C) = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} ; \quad W(Q) = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} ;$$

$$V(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{x^2 + R^2} - x \right)$$

Exercice 2 On considère le filtre passe-bas suivant :



Sa fonction de transfert a pour module : $T = \frac{1}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}} = \left| \frac{U_1}{U_2} \right|$


- 1) Exprimer le module T en fonction de $\Omega = \frac{\omega}{\omega_0}$ avec $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.
- 2) Etudier les variations et représenter graphiquement la fonction $\Omega \mapsto T(\Omega)$ sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

Exercice 3 L'impédance d'un dipôle R, L, C sous une tension alternative de fréquence f est :

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2} \text{ avec : } \omega = 2\pi f.$$

- 1) Déterminer le signe de la dérivée de la fonction $\omega \mapsto Z(\omega)$ sur \mathbb{R}^{+*} .
- 2) Etudier la fonction $\omega \mapsto I(\omega) = \frac{U}{Z(\omega)}$ où U est l'amplitude constante de la tension, puis la tracer.

Exercice 4 Soit un générateur de force électromotrice E , de résistance interne r et le circuit ci-dessous. Déterminer la valeur de la résistance R pour que la puissance dissipée y soit maximum (on trouve $P(R) = E^2 \cdot \frac{R}{(R+r)^2}$)



Exercice 5 Calculer la limite des fonctions suivantes au « point » a donné.

1) $f(x) = \frac{(x^4 - 1)(x^2 + 3)}{2x(x^3 - 2)(x^2 + 2)}$ a = ∞

2) $g(x) = \frac{(x^7 - 2x)(x - 4)}{(x^6 - 2x)(x^3 - x)}$ a = ∞

3) $h(x) = \frac{x^6 - 3x^4 + 1}{(x + 1)(x^4 + 3)}$ a = ∞

4) $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^3 - 1}$ a = 1

5) $f(x) = \frac{x^3 + \sqrt{x - 1}}{\sqrt{x} - 2}$ a = ∞

6) $f(x) = \frac{\sqrt{x + 1} - 2}{x - 3}$ a = 3

Exercice 6 Soit la fonction f définie sur \mathbb{R}^* par $x \mapsto f(x) = \text{Arctan}x + \text{Arctan}\frac{1}{x}$

Calculer $f'(x)$ puis en déduire l'expression de $f(x)$ sur \mathbb{R}^{+*} et \mathbb{R}^{-*}

Notes

Partie E : Exercices d'entraînement pour les poursuites d'études longues

Exercice 1 Avec des logarithmes.


- 1) Soit g la fonction numérique définie sur \mathbb{R}^{+*} par : $g(x) = 1 + \frac{1}{x} + \ln x$. Etudier le signe de la fonction g sur \mathbb{R}^{+*}
- 2) Etudier la fonction f définie sur \mathbb{R}^{+*} par : $f(x) = (x + 1) \cdot \ln x$.

Exercice 2 Dans le circuit ci-dessous on suppose que le condensateur est initialement chargé :

On note U_0 la tension à ses bornes. A l'instant $t = 0$ on ferme l'interrupteur K . La fonction $t \mapsto e(t)$ est définie par : $e(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ E & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$.


On démontre que la fonction $t \mapsto u(t)$ est définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$u(t) = (U_0 - E)e^{-\frac{t}{RC}} + E.$$



- 1) Etudier sur $[0; +\infty[$ les variations de la fonction $t \mapsto u(t)$ et calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t)$, on discutera suivant les valeurs relatives de U_0 et E .
- 2) Déterminer la tangente à la courbe représentative de u à l'origine et donner l'allure de cette dernière.

Exercice 3 Dans une plaque circulaire de diamètre 100 cm, on veut découper une plaque rectangulaire de surface maximale. Quelles sont les dimensions de cette plaque rectangulaire ?



Exercice 4 L'étude d'un circuit électrique conduit à étudier sur $[0; +\infty[$ la fonction $i : t \mapsto i(t) = I(e^{-\frac{t}{2}} + 2te^{-t})$ avec $I > 0$. On se propose de représenter graphiquement la fonction i .

- 1) Soit f , la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(t) = 1 - t - \frac{1}{4}e^{\frac{t}{4}}$. Etudier les variations de f ; en déduire que l'équation $f(t) = 0$ admet sur $[0; +\infty[$ une solution unique t_1 et que t_1 est élément de $[0.65 ; 0.66]$.
- 2) Déduire de 1) le signe de $f(t)$.
- 3) Etudier les variations de i . Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} i(t)$. Tracer la courbe représentant i .

Exercice 5 Calculer à l'aide du nombre dérivé la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sin x - \sqrt{2}}{2 \cos x - \sqrt{2}}$

Exercice 6 Calculer : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - (1 + \frac{x}{2})}{x^2}$. En déduire que si x tend vers 0, alors $\sqrt{1+x}$ est équivalent à $1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2$.

Exercice 7 Calculer les limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\operatorname{sh} x)^{1/x} \quad (\text{on utilisera le logarithme et un équivalent.})$$

Exercice 8 Soit la fonction : $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$

- 1) Montrer que f admet deux domaines de monotonie.
- 2) Exprimer dans chacun de ces domaines la fonction réciproque.
- 3) Tracer dans chacun des cas les courbes de f et f^{-1} sur le même graphique.

Exercice 9 On donne les deux fonctions : $f(x) = \operatorname{Arc tan} x$ et $g(x) = \operatorname{Arctan} \frac{2x}{1-x^2}$

- 1) Ensembles de définition et dérivée de $g(x)$
- 2) Etablir une relation entre $f'(x)$ et $g'(x)$ et déduire la relation entre $g(x)$ et $f(x)$.
- 3) Tracer les courbes de $f(x)$ et $g(x)$ sur le même graphique.

Exercice 10 Etude et représentation des fonctions : $x \mapsto y = f_1(x) = \sin(\operatorname{Arcsin} x)$ et $x \mapsto y = f_2(x) = \operatorname{Arcsin}(\sin x)$

-----Extraits d'énoncés de préparation aux concours-----

Exercice extrait de l'épreuve de mathématiques au concours ENSEA 2005

- 1) Soit g , la fonction définie par : $g(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x}\right) + \frac{1}{x-1}$. Etudier g (ensemble de définition, tableau de variation et limites), puis en déduire le signe de g sur son ensemble de définition.
- 2) Soit f , la fonction définie par : $f(x) = e^{x \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right)}$. Etudier f .

Exercice extrait de l'épreuve de mathématiques au concours ENSEA 2003

Etudier la fonction f , définie par : $f(x) = x - \ln(\cosh x)$