





## Chapitre 2 : Fonctions numériques à variable réelle. Signaux du GEII



## Partie A : Etude d'une fonction


### I. Notions de base

#### 1) Définitions et notations

Une fonction  $f$ , est définie sur  $D$ , un sous-ensemble de  $\mathbb{R}$ , si à tout  $x$  de  $D$  on peut associer un unique nombre noté  $f(x)$ , et appelé image de  $x$  par  $f$ .

On écrit       $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$   
                   $x \longmapsto f(x)$

D est appelé l'ensemble de définition de  $f$ , on le note aussi  $D_f$ .



On munit le plan d'un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .  
La courbe  $C$  représentant  $f$  est l'ensemble des points  $M$  de coordonnées  $M(x, f(x))$ .

$$\overrightarrow{OM} = x \vec{i} + f(x) \vec{j}$$

$y = f(x)$  est l'équation cartésienne de  $f$ .


Une fonction peut être obtenue à partir d'une formule (signal déterministe), d'un tableau de valeurs relevé d'expériences physiques (signal numérique), ou bien d'une courbe.

#### 2) Croissance comparée et fonctions usuelles


Pour des grandes valeurs positives de  $x$  :  $\ln(x) < \sqrt[3]{x} < \sqrt{x} < x < x^2 < x^3 < \dots < x^n < e^x$

Page 5 chapitre 3

Pour des grandes valeurs positives de  $x$  :  $\ln(x) < \sqrt[3]{x} < \sqrt{x} < x < x^2 < x^3 < \dots < x^n < e^x$



$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} < 0 \quad \text{et} \quad x - a > 0 \Rightarrow f \downarrow$$




$$a < b$$

$$f(b) > f(a)$$

$$f \downarrow$$

"départ"  $\leftrightarrow \mathcal{D}_f$  = ensemble de définition.  
 $f: ]-5; 5] \rightarrow \mathbb{R}$  ou  $f: ]-5; 5]$   
 $x \mapsto y = f(x)$   
 "  $a$  est associé  $y$  "  $[-5; 5; 5; 5]$



<p><u>Echelon-unité</u> : (Heaviside <math>\Phi</math>)</p> <p><math>U: \mathbb{R} \longrightarrow \{0, 1\}</math>  <math>x \longmapsto U(x)</math></p> <p>avec <math>U(x) = \begin{cases} 1 &amp; \text{si } x \geq 0 \\ 0 &amp; \text{si } x &lt; 0 \end{cases}</math></p>	<p>Ensemble de définition : <math>\mathbb{R}</math>  Ensemble image : <math>U(\mathbb{R}) = \{0, 1\}</math>  On dit que la fonction <math>U</math> est continue sur <math>\mathbb{R}</math>, sauf en 0.</p> <p><math>\lim_{x \rightarrow 0^-} U(x) = 0</math>  <math>\lim_{x \rightarrow 0^+} U(x) = 1</math></p>
<p><u>Triangle</u> : (notée aussi tri)</p> <p><math>\Delta: \mathbb{R} \longrightarrow [0; 1]</math>  <math>x \longmapsto \Delta(x)</math></p> <p><math>\Delta(x) = \begin{cases} 1 -  x  &amp; \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 0 &amp; \text{sinon} \end{cases}</math></p>	<p>Ensemble de définition : <math>\mathbb{R}</math>  Ensemble image : <math>[0; 1]</math>  On dit que la fonction triangle est continue sur <math>\mathbb{R}</math>.</p>
<p><u>Puissance impaire</u> : <math>n \in \mathbb{N}</math></p> <p><math>f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}</math>  <math>x \longmapsto f(x) = x^{2n+1}</math></p>	<p>Ensemble de définition : <math>\mathbb{R}</math>  Ensemble image : <math>\mathbb{R}</math>  On dit que la fonction <math>f</math> est continue sur <math>\mathbb{R}</math>.</p> <p><math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty</math>  <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty</math></p>
<p><u>Puissance paire</u> : <math>n \in \mathbb{N}</math></p> <p><math>f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+</math>  <math>x \longmapsto f(x) = x^{2n}</math></p>	<p>Ensemble de définition : <math>\mathbb{R}</math>  Ensemble image : <math>\mathbb{R}_+ = [0; +\infty[</math>  On dit que la fonction <math>f</math> est continue sur <math>\mathbb{R}</math>.</p> <p><math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty</math>  <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty</math></p>
<p><u>Racine carrée</u> :</p> <p><math>f: \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+</math>  <math>x \longmapsto f(x) = \sqrt{x}</math></p>	<p>Ensemble de définition : <math>\mathbb{R}_+</math>  Ensemble image : <math>\mathbb{R}_+</math>  On dit que la fonction <math>f</math> est continue sur <math>\mathbb{R}_+</math></p> <p><math>\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty</math></p>
<i>Page 6 et 7 chapitre 3</i>	
<p><u>Racine cubique</u> :</p> <p><math>f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}</math>  <math>x \longmapsto f(x) = \sqrt[3]{x}</math></p>	<p>Ensemble de définition : <math>\mathbb{R}</math>  Ensemble image : <math>\mathbb{R}</math>  On dit que la fonction <math>f</math> est continue sur <math>\mathbb{R}</math>.</p> <p><math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty</math>  <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty</math></p>
<p><u>Inverse</u> :</p> <p><math>f: \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}^*</math>  <math>x \longmapsto f(x) = 1/x</math></p>	<p>Ensemble de définition : <math>\mathbb{R}^*</math>  Ensemble image : <math>\mathbb{R}^*</math>  <math>f</math> est continue sur <math>]0; +\infty[</math>  <math>f</math> est continue sur <math>]-\infty; 0[</math></p> <p><math>\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0</math>  <math>\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty</math>  <math>\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty</math>  <math>\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty</math></p>
<p><u>Valeur absolue</u> :</p> <p><math>f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+</math>  <math>x \longmapsto f(x) =  x </math></p>	<p>Ensemble de définition : <math>\mathbb{R}</math>  Ensemble image : <math>\mathbb{R}_+</math>  <math>f</math> est continue sur <math>\mathbb{R}</math>.</p> <p><math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty</math>  <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty</math></p>
<p><u>Exponentielle</u> :</p> <p><math>f: \mathbb{R} \longrightarrow ]0; +\infty[</math>  <math>x \longmapsto f(x) = e^x</math></p> <p><math>e^0 = 1</math>  <math>e^{a+b} = e^a \times e^b</math>  <math>(e^a)^n = e^{a \cdot n}</math>  <math>e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}</math>  <math>e^{-b} = \frac{1}{e^b}</math></p>	<p>Ensemble de définition : <math>\mathbb{R}</math>  Ensemble image : <math>]0; +\infty[ = \mathbb{R}_+</math>  <math>f</math> est continue sur <math>\mathbb{R}</math>.</p> <p><math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0</math>  <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty</math></p>
<p><u>Logarithme népérien</u> :</p> <p><math>f: ]0; +\infty[ \longrightarrow \mathbb{R}</math>  <math>x \longmapsto f(x) = \ln(x)</math></p> <p><math>\ln(1) = 0</math>  <math>\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b)</math>  <math>\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)</math>  <math>\ln(a^n) = n \cdot \ln(a)</math></p>	<p>Ensemble de définition : <math>\mathbb{R}_+</math>  Ensemble image : <math>\mathbb{R}</math>  <math>f</math> est continue sur <math>\mathbb{R}_+</math></p> <p><math>\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty</math>  <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty</math></p>

## II. Ensemble de définition et ensemble d'étude d'une fonction

### 1) Ensemble de définition

Soit  $f$ , une fonction. L'ensemble de définition de  $f$  est l'ensemble des nombres réels  $x$ , pour lesquels  $f(x)$  existe.

Page 8&9 chapitre 3

Rappel des opérations impossibles division par zéro, racine carrée d'un nombre négatif, logarithme d'un nombre négatif ou nul, autrement dit :

$$\mathbb{R}^* \xrightarrow{x} \mathbb{R} \quad x \mapsto 1/x$$

$$[0; +\infty[ \xrightarrow{x} \mathbb{R} \quad x \mapsto \sqrt{x}$$

$$]0; +\infty[ \xrightarrow{x} \mathbb{R} \quad x \mapsto \ln(x)$$

#### Exemples

✓ Soit  $f(x) = \frac{x^2-1}{x+3}$ , déterminer l'ensemble de définition de  $f$

$$\mathcal{D}_f = \{x \in \mathbb{R} / \frac{x^2-1}{x+3} \text{ existe}\}$$



$$\Leftrightarrow x+3 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -3$$

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} - \{-3\} = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$$

"privé de"

✓ Soit  $g(x) = \exp\left(\frac{x^2-1}{x+3}\right)$ , déterminer l'ensemble de définition de  $g$


$$\mathcal{D}_g = \left\{ x \in \mathbb{R} / e^{\frac{x^2-1}{x+3}} \text{ existe} \right\} = \mathbb{R} - \{-3\}$$

✓ Soit  $h(x) = \ln\left(\frac{x^2-1}{x+3}\right)$ , déterminer l'ensemble de définition de  $h$

$$\mathcal{D}_h = \left\{ x \in \mathbb{R} / \ln\left(\frac{x^2-1}{x+3}\right) \text{ existe} \right\} = ]-3; -1[ \cup ]1; +\infty[$$

$\Leftrightarrow \frac{x^2-1}{x+3} > 0 \text{ et } x+3 \neq 0$

$$x+3 > 0 \Leftrightarrow x > -3$$



✓ Soit  $k(x) = \sqrt{\frac{x^2-1}{x+3}}$ , déterminer l'ensemble de définition de  $k$

Page 10 chapitre 3


$$\mathcal{D}_k = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{\frac{x^2-1}{x+3}} \text{ existe} \right\} = ]-3, -1] \cup [-1, +\infty[.$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2-1}{x+3} \geq 0$$


## 2) Parité

- ✓ Une fonction  $f$ , définie sur  $D$ , un sous-ensemble de  $\mathbb{R}$  centré en 0, est dite paire lorsque :  $\forall x \in D \quad f(-x) = f(x)$ . Sa représentation graphique est alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On étudie alors  $f$  sur  $D \cap \mathbb{R}_+$
- ✓ Une fonction  $f$ , définie sur  $D$ , un sous-ensemble de  $\mathbb{R}$  centré en 0, est dite impaire lorsque :  $\forall x \in D \quad f(-x) = -f(x)$ . Sa représentation graphique est alors symétrique par rapport à l'origine du repère. On étudie alors  $f$  sur  $D \cap \mathbb{R}_+$

$f$  est paire :



$f$  est impaire :



Exemples

- ✓ La fonction cosinus  $x \mapsto x^2$  sont paires sur  $\mathbb{R}$ , les fonctions sinus et  $x \mapsto x^3$  sont impaires sur  $\mathbb{R}$ . La fonction tangente est impaire sur  $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\}$ .
- ✓ Soit  $f$ , la fonction définie par :  $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ , étudier la parité de  $f$ .

Page 11 chapitre 3

$D_f = \mathbb{R} - \{1\}$  est non centré en 0 donc  $f$  est ni paire, ni impaire.

$$f(-x) = \frac{(-x)^2}{-x-1} = \frac{x^2}{-x-1} \neq f(x)$$

Contre-exemple :  $f(-2) = \frac{4}{-3} \neq f(2) = \frac{4}{1}$  et  $f(-2) \neq -f(2)$  donc  $f$  est ni paire, ni impaire.

- ✓ Soit  $g$ , la fonction définie par :  $g(x) = \sin(x) - \sin(3x)$ , étudier la parité de  $g$ .

$D_g = \mathbb{R}$  centré en 0.

$$g(-x) = \sin(-x) - \sin(-3x) = -\sin x + \sin(3x) = -g(x)$$

$g$  est impaire.

- ✓ On appelle sinus hyperbolique, la fonction définie par :  $\text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$  étudier la parité de  $\text{sh}$ .

$D_{\text{sh}} = \mathbb{R}$  centré en 0.

$$\text{sh}(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\text{sh}x \text{ car } -\text{sh}x = -\frac{e^{-x} - e^x}{2} = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$\text{sh}$  est donc impaire.

## Opérations

- ✓ Si  $f$  et  $g$  sont paires sur  $D$ , alors  $f \times g$  (et  $f/g$   $g \neq 0$ ) est paire sur  $D$
- ✓ Si  $f$  et  $g$  sont impaires sur  $D$ , alors  $f \times g$  (et  $f/g$   $g \neq 0$ ) est paire sur  $D$
- ✓ Si  $f$  est impaire et  $g$  est paire sur  $D$ , alors  $f \times g$  (et  $f/g$   $g \neq 0$ ) est impaire sur  $D$

## Exemple

Soit  $f$ , la fonction, définie par :  $f(x) = \frac{x^3 \cdot \sin^2(x)}{\cos(x)}$  sur  $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\}$  Etudier la parité de  $f$ .

$x \mapsto x^3$  est impaire

$x \mapsto \sin^2 x$  est paire

$x \mapsto \cos x$  est paire

donc  $f$  est impaire

### 3) Périodicité


Une fonction f, définie sur  $D$ , un sous-ensemble de  $\mathbb{R}$ , est dite périodique lorsqu'il existe un nombre réel positif,  $T$ , le plus petit possible tel que :

$\forall x \in D \quad f(x + T) = f(x)$ . On dit aussi que  $f$  est  $T$ -périodique.

Soit  $f_0$ , la fonction définie par :  $f_0(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in [x_0, x_0 + T[ \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ .  $f_0$  est appelée le motif de la fonction  $f$ .

La représentation graphique de  $f$  est obtenue en appliquant sur la courbe représentant  $f_0$ , les translations de vecteur  $kT\vec{i}$  où  $k$  est un entier relatif.  
On étudie alors la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[x_0, x_0 + T[$ .

Page 12 chapitre 3



Remarque On peut alors écrire : (voir TP)


$$f(t) = \dots + f_0(t + 2T) + f_0(t + T) + f_0(t) + f_0(t - T) + f_0(t - 2T) + \dots = \sum_{-\infty}^{\infty} f_0(t - kT)$$

### Exemples

- ✓ Les fonctions  $t \mapsto \cos(\omega t + \varphi)$  et  $t \mapsto \sin(\omega t + \varphi)$  sont  $\frac{2\pi}{\omega}$  - périodiques. La fonction  $t \mapsto \tan(\omega t + \varphi)$  est  $\frac{\pi}{\omega}$  - périodique sur  $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\}$
- ✓ Soit  $g$ , la fonction définie par :  $g(x) = \underbrace{\sin(x)}_{1\text{ tour}} - \underbrace{\sin(3x)}_{3\text{ tours}}$ , étudier la périodicité de  $g$ .


.....  $g$  est  $2\pi$  - périodique, car :  $\frac{2\pi}{3}$  - périodique  $\rightarrow \frac{2\pi}{3}$  - périodique

$$g(x+2\pi) = \underbrace{\sin(x+2\pi)}_{1\text{ tour}} - \underbrace{\sin(3x+6\pi)}_{3\text{ tours}} = \sin x - \sin(3x) = g(x).$$



$$f(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$$f(t + \frac{2\pi}{\omega}) = A \cdot \cos\left(\omega(t + \frac{2\pi}{\omega}) + \varphi\right) = A \cdot \cos\left(\omega t + \underbrace{2\pi + \varphi}_{1\text{ tour}}\right) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi) = f(t)$$



$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ car :}$$

1 tour

### III. Dérivabilité

#### 1) Définitions et opérations

Page 14 chapitre 3

Soit  $f$ , une fonction définie en  $a$ , on dit que  $f$  est dérivable en  $a$  lorsque : la limite suivante  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$  existe et est finie. On la note alors  $f'(a)$  et on l'appelle **nombre dérivé de  $f$  en  $a$** .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existe et est finie. On la note alors  $f'(a)$

## Exemples

Page 14 chapitre 3

✓ Soit  $f$ , la fonction définie par :  $f(x) = x^2$ .  $\mathcal{D}f = \mathbb{R}$ .

$$\text{Dérivabilité de } f \text{ en } 3 : L = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{0}{0} \text{ "F+}"$$

$$L = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = 6 \text{ est finie donc } f \text{ est dérivable en } 3 \text{ et } f'(3) = 6$$

$$\text{Dérivabilité de } f \text{ en } a \in \mathcal{D}f = \mathbb{R} : L = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} = \frac{0}{0} \text{ "F+}"$$

$$L = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)(x+a)}{x-a} = 2a \text{ est finie donc } f \text{ est dérivable sur } \mathbb{R} \text{ et } f'(a) = 2a$$

$$\text{Sont } f'(x) = 2x$$

Soit  $f$ , une fonction définie en  $a$ , on dit que  $f$  est dérivable en  $a$  lorsque : la limite suivante  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  existe et est finie. On la note alors  $f'(a)$  et on l'appelle nombre dérivé de  $f$  en  $a$ .

Page 14 chapitre 3

Soit  $f$ , une fonction définie sur  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ , on dit que  $f$  est dérivable sur  $I$ , lorsque  $f$  est dérivable en tout point  $a$  de  $I$ . On appelle alors fonction dérivée de  $f$  et on note  $f'$ , la fonction qui à tout élément  $a$  de  $I$ , associe son nombre dérivé  $f'(a)$ .

Si  $f$  et  $g$  sont dérivables sur  $I$ , alors :  $\alpha f$ ,  $f+g$ ,  $f \times g$  et  $f/g$  (avec  $g \neq 0$ ) sont dérivables sur  $I$ . ( $\alpha$  est un nombre réel) et  $(\alpha f)' = \alpha f'$ ,  $(f+g)' = f' + g'$ ,  $(fg)' = f'g + fg'$  et  $(f/g)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ .

Si  $f$  est dérivable sur  $I$  et  $g$  est dérivable sur  $f(I)$ , alors  $g \circ f$  est dérivable sur  $I$  et :  $(g \circ f)' = (g' \circ f) \times f'$

"rond"

2) Formulaire  $U$  est une fonction dérivable sur  $I$ .

Cas particulier:  $U = x \Rightarrow U' = 1$

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} - \{1\}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^* = ]0; +\infty[$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}^*$$

$$(e^x)' = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(\ln(x))' = \frac{1}{x} \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^*$$

Cas général :

$$(U^n)' = n \cdot U' \cdot U^{n-1}, \quad U(I) \subseteq \mathbb{R}$$

ex:  $\left((3x+5)^{10}\right)' = 10 \times 3 \times (3x+5)^9$


$$(\sqrt{U})' = \frac{U'}{2\sqrt{U}}, \quad U(I) \subseteq \mathbb{R}_+^*$$

$$\left(\frac{1}{U}\right)' = \frac{-U'}{U^2}, \quad U(I) \subseteq \mathbb{R}^*$$

$$(e^U)' = U' e^U, \quad U(I) \subseteq \mathbb{R}$$

$$(\ln(U))' = \frac{U'}{U}, \quad U(I) \subseteq \mathbb{R}_+^*$$

Page 16 chapitre 3



$$(\sin(x))' = \cos(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(\sin(U))' = \cancel{U'} \cdot \cos(U) \quad , \quad U(I) \subseteq \mathbb{R}$$

$$(\cos(x))' = -\sin(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(\cos(U))' = -\cancel{U'} \cdot \sin(U) \quad , \quad U(I) \subseteq \mathbb{R}$$

$$(\tan(x))' = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$$

$$\forall x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ où } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$(\tan(U))' = \frac{\cancel{U'}}{\cos^2(U)} = (1 + \tan^2(U)) \cdot \cancel{U'}$$

$$U(I) \subseteq \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ où } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Pourquoi:  $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$  ?? ( $u > 0$ )

$f(x) = \ln(u(x))$  est-elle dérivable en  $a \in \mathcal{D}_{\ln(u)}$  ?

Page 16 chapitre 3

On suppose que l'on sait que  $\ln$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$  et  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ .

$$\begin{aligned}
 L &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln(u(x)) - \ln(u(a))}{x - a} \quad \text{avec } u(x) - u(a) \\
 &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{u(x) - u(a)}{x - a} \times \frac{\ln(u(x)) - \ln(u(a))}{u(x) - u(a)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{u(x) - u(a)}{x - a} \times \lim_{x \rightarrow u(a)} \frac{\ln x - \ln(u(a))}{x - u(a)} \\
 &\quad \text{avec } \ln' (u(a)) = \frac{1}{u(a)} \\
 ? \quad L &= \frac{u'(a)}{u(a)}
 \end{aligned}$$

Exemples

✓  $f(x) = (2x - 3) \cdot \cos x$

$$(U \cdot V)' = U'V + UV'$$

$$(\cos x)' = -\sin x.$$


Page 16&17 chapitre 3

$D_f = \mathbb{R}$

$$f'(x) = 2 \cdot \cos x + (2x - 3) \cdot -\sin x = 2 \cos x - (2x - 3) \sin x$$

$D_{f'} = \mathbb{R}$

$D_{f'} = \mathbb{R}$



✓  $g(x) = \frac{\sin x}{x}$

$$\left(\frac{U}{V}\right)' = \frac{U'V - UV'}{V^2}$$

$$(\sin x)' = \cos x.$$

$D_g = \mathbb{R}^*$

$$g'(x) = \frac{x \cdot \cos x - \sin x}{x^2}$$

$$D_{g'} = \mathbb{R}^*$$

Remarque

$$\text{sinc}(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

20

.....  
Dg = .....

Page 17 chapitre 3

$$\checkmark \quad i(t) = \underbrace{V_{eff} \sqrt{2}}_{cte} \cdot \cos(\underbrace{\omega t + \varphi}_{U \Rightarrow U' = \omega})$$
$$(cte \cdot U)' = cte \cdot U'$$
$$(\cos(U))' = -U' \sin U.$$

Di =  $\mathbb{R}$  .....

$$i'(t) = -V_{eff} \sqrt{2} \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

.....  
Di =  $\mathbb{R}$  .....

$$\checkmark h(t) = \underbrace{(t^2 + 5)^{10}}_{U \Rightarrow U' = 2t} \quad (U^n)' = n U^{n-1} \cdot \underline{U'}$$

D<sub>h</sub> =  $\mathbb{R}$ .....

$$h'(t) = \cancel{10} \cancel{(t^2 + 5)^9} \times 2t = 20t(t^2 + 5)^9$$

Page 17 chapitre 3

D<sub>h'</sub> =  $\mathbb{R}$ .....

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a} \quad \text{||}$$


"0/0" FI

✓ A l'aide de la définition du nombre dérivé du sinus en 0, calculer :  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1$

$$L = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t - \sin 0}{t - 0} = (\sin)'(0) \quad \text{car sin. est dérivable en 0}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = \underline{0/0 = 1}$$

## Interprétation graphique



$$\frac{y_n - y_A}{x_n - x_A}$$

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

$$\boxed{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}$$

est la pente de la droite (AM)

Lorsque  $x$  tend vers  $a$ ,  $M$  tend vers  $A$  le long de la courbe, et la droite (AM) se rapproche de la droite  $T_a$ , qui est la tangente à la courbe au point  $A$ .

Conclusion :

*f est dérivable en a*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

est la pente de la tangente à la courbe au point  $A(a, f(a))$ .

B

Page 18 chapitre 3

Conséquence Equation de la tangente  $T_a$  :  $y = mx + p$

la pente de  $T_a$  est :  $f'(a)$  donc

Page 18 chapitre 3

$$T_a : y = f'(a) \cdot x + p$$

$$A \in T_a \iff y_A = f'(a) \cdot x_A + p$$

$A(a; f(a))$

$$\iff f(a) = f'(a) \cdot a + p$$

$$\iff p = f(a) - f'(a) \cdot a$$

Donc :  $T_a : y = \underline{f'(a) \cdot x} + \underline{f(a) - f'(a) \cdot a}$ .

$$y = f(a) + f'(a) \cdot (x - a)$$

Q.

## Exemples

Page 19 chapitre 3

✓ Equation de la tangente en O à la courbe représentant la fonction  $f$  définie par :

$$f(x) = x^3$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto y = f(x) = x^3$$


$$T_0: y = f(0) + f'(0) \cdot (x-0)$$

$$f(0) = 0 \quad f'(x) = 3x^2 \quad f'(0) = 0$$

$$T_0: y = 0$$

$$T_2: y = f(2) + f'(2)(x-2)$$


$$T_2: y = 8 + 12(x-2) \quad 8-24$$



$$|X| = \begin{cases} X & \text{si } X \geq 0 \\ -X & \text{si } X \leq 0. \end{cases}$$

✓ Equation de la tangente en O à la courbe représentant la fonction  $f$  définie par :  $f(x) = \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

sinus hyperbolique -



$$T_0 : y = f(0) + f'(0) \cdot x$$


$$f(0) = \frac{1-1}{2} = 0 \quad (e^x)' = e^x \quad (e^{-x})' = -e^{-x}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot (e^x - e^{-x})' = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) = \text{ch}x$$

$$f'(0) = 1$$

$$T_0 : y = x$$

✓ La fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0.



$$f(x) = \sqrt{x} \quad \mathcal{D}_f = \mathbb{R}_+ = [0; +\infty[.$$

$$f'(x) = (x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \mathcal{D}_{f'} = \mathbb{R}_+^* = ]0; +\infty[.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\sqrt{x}} = +\infty.$$

En 0, la tangente à la courbe est donc verticale tournée vers les ordonnées positives.

$$\frac{1}{2\sqrt{10^{-16}}} = \frac{1}{2 \cdot 10^{-8}} = \frac{1}{2} \cdot 10^8$$


$$x^{-n} = \frac{1}{x^n} \text{ et } \frac{1}{x^{-n}} = x^n$$

✓ Redressement double alternance :  $V(t) = |\sin(t)|$ .

Page 20 chapitre 3

Dérivabilité de  $V$  en 0 :  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{V(t) - V(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|\sin t| - 0}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|\sin t|}{t}$


$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{|\sin t|}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1 \text{ voir page 17} \\ \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{|\sin t|}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{-\sin t}{t} = -1 \end{array} \right. \text{ donc } V \text{ n'est pas dérivable en 0}$$



✓ U, la fonction échelon-unité définie et représentée ci-dessous est-elle dérivable sur son ensemble de définition ?

$$\underline{U(t)} = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t \geq 0 \end{cases} = \underline{\Phi(t)} \text{ échelon de Heaviside.}$$

$$u(0) = 1 \quad \partial u = R.$$



U est continue sur  $\mathbb{R}^*$  se note :  $u \in C^0(\mathbb{R}^*)$

U est dérivable sur  $\mathbb{R}^*$

Dérivabilité  $\Rightarrow$  Continuité

~~✗~~ C'est faux

Page 20 chapitre 3

### 3) Sens de variation

Soit  $f$ , une fonction dérivable sur un intervalle  $I$  :

Si  $f' \geq 0$ ,  $f$  est croissante sur  $I$

Si  $f' \leq 0$ ,  $f$  est décroissante sur  $I$

Page 21 chapitre 3



### 4) Extremum d'une fonction

#### Définitions :

- Une fonction  $f$  admet un **maximum** en  $x_0$  sur un intervalle  $I$  où elle est définie, si pour tout  $x$  de  $I$ , on a :  $f(x) \leq f(x_0)$

- Une fonction  $f$  admet un **minimum** en  $a$  sur un intervalle  $I$  où elle est définie, si pour tout  $x$  de  $I$ , on a :  $f(x) \geq f(x_0)$

**Théorème :** Si une fonction  $f$  est dérivable sur un intervalle  $I$  contenant  $x_0$  et si  $f'$  s'annule en  $x_0$  en changeant de signe alors la fonction  $f$  présente un **extremum** en  $x_0$ .



## 6) Dérivées successives – Fonction de classe $C^n$

**Définitions** Si  $f$  est continue sur l'intervalle  $I$ , on note :  $f \in C^0(I)$

Si  $f$  est dérivable sur l'intervalle  $I$ , et si  $f' \in C^0(I)$ , alors on note :  $f \in C^1(I)$

Si  $f'$  est dérivable sur  $I$ , alors on note  $f'' = (f')'$  que l'on appelle dérivée seconde de  $f$ . Si de plus  $f'' \in C^0(I)$ , alors on note  $f \in C^2(I)$

Plus généralement on définit la dérivée  $n^{\text{ième}}$  de  $f$ , notée  $f^{(n)}$ . Lorsque  $f^{(n)} \in C^0(I)$ , on note  $f \in C^n(I)$ .

### Exemple

$$i(t) = \cos(\omega t + \varphi)$$

$$i'(t) = \dots$$

$$i''(t) = \dots$$

$$i''(t) + \omega^2 i(t) = \dots$$

On dit que  $i$  est une solution de l'équation différentielle :  $y''(t) + \omega^2 y(t) = 0$ .

Page 22 chapitre 3

## Exercices

Page 39 chapitre 3

Exercice 1 Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son ensemble de définition, calculer sa fonction dérivée et son ensemble de définition :

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 1 ; \quad f(x) = x + \frac{1}{x} \text{ avec } x \neq 0 ; \quad g(t) = \frac{t+1}{t-1} \text{ avec } t \neq 1 ;$$

$$h(t) = \sqrt{t^2 + 1} ; \quad l(\omega) = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + 1}} ; \quad X(\omega) = \left( L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2 ; \quad Z(\omega) = \sqrt{R^2 + L^2\omega^2} ;$$

$$i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi) ; \quad f_0(C) = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} ; \quad W(C) = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} ; \quad W(Q) = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} ;$$

$$V(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left( \sqrt{x^2 + R^2} - x \right)$$

$$X(\omega) = \left( L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2$$

$$\mathcal{D}_X = \mathbb{R}^*$$

$$(U^2)' = 2U'U$$

$$U' = \left( L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)' = L \cdot (\omega)' - \frac{1}{C} \cdot \left( \frac{1}{\omega} \right)' = L - \frac{1}{C} \cdot \frac{-1}{\omega^2}$$

$$U' = L + \frac{1}{C\omega^2}$$

$$X'(\omega) = 2 \left( L + \frac{1}{C\omega^2} \right) \left( L\omega - \frac{1}{C\omega} \right) \quad \mathcal{D}_{X'} = \mathbb{R}^*$$


Notes  $Z(\omega) = \sqrt{R^2 + L^2 \omega^2} = U \geq 0$   $\mathcal{D}_Z = \mathbb{R}$ . Page 39 chapitre 3

$$\begin{aligned} (\sqrt{U})' &= U' \\ (U^{\frac{1}{2}})' &= \frac{1}{2} \cdot U' \cdot U^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} U' \cdot U^{-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \cdot U' \cdot \frac{1}{U^{\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

$$U' = (R^2 + L \cdot \omega^2)' = \underbrace{(R^2)'_w}_0 + L \cdot (\omega^2)'_w = L^2 \cdot 2\omega$$

$$Z'(\omega) = \frac{2L \cdot \omega}{2\sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}} > 0$$

$$\sqrt{R^2 + L^2 \cdot 10^{18}}$$



$$Z(0) = \sqrt{R^2} = R \text{ car } R > 0$$

Notes  $i(t) = \underbrace{I\sqrt{2}}_{\text{const}} \cos(\underbrace{\omega t + \varphi}_{\text{const}})$   $\mathcal{D}_i = R$ .

Page 39 chapitre 3

$$(\cos u)' = -u' \sin u$$

$$u' = \omega$$

$$i'(t) = -I\sqrt{2} \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi) \quad \mathcal{D}_{i'} = R$$

$$(\alpha \cdot f)' = \underbrace{\alpha' f}_{0} + \alpha f'$$

$(L > 0)$

$$f_0(c) = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot c}}$$

$$L \cdot c > 0 \Leftrightarrow c > 0$$

$$\mathcal{D}_{f_0} = R^* = R^{**}$$

$$f'_0(c) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{Lc}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L}} \cdot \frac{1}{\sqrt{c}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L}} \cdot c^{-\frac{1}{2}} \quad (x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

$$f'_0(c) = \frac{1}{2\pi\sqrt{L}} \times \frac{-1}{2} \cdot c^{-\frac{1}{2}-1 = -\frac{3}{2}} = \frac{-c^{-\frac{3}{2}}}{4\pi\sqrt{L}} = -\frac{1}{4\pi\sqrt{L} \cdot c^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1}{4\pi c\sqrt{Lc}}$$

$$c^{\frac{3}{2}} = (c^{\frac{1}{2}})^3 = (\sqrt{c})^3$$

$$c^{\frac{3}{2}} = c^{1+0,5} = c \cdot \sqrt{c}$$

$R \neq 0$

Notes:  $V(x) = \frac{5}{2\epsilon_0} \times \left( \underbrace{\sqrt{x^2 + R^2}}_{\geq 0} - x \right)$

$$\mathcal{D}_V = \mathbb{R}.$$

Page 39 chapitre 3

$$V'(x) = \frac{5}{2\epsilon_0} \cdot \left( \underbrace{\sqrt{x^2 + R^2}}_U - x \right)' \rightarrow (\sqrt{U})' = \frac{U'}{2\sqrt{U}}$$

$$V'(x) = \frac{5}{2\epsilon_0} \cdot \left( \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + R^2}} - 1 \right) \quad \mathcal{D}_{V'} = \mathbb{R}.$$


Notes

$$g(t) = \frac{t+1}{t-1}$$

$$g'(t) = \frac{-2}{(t-1)^2}$$

Page 39 chapitre 3

$$\frac{2}{-0.0001} = -2 \times 1000$$



$$\lim_{t \rightarrow 1^-} g(t) = \lim_{\substack{t \rightarrow 1 \\ t < 1}} \frac{t+1}{t-1} = \frac{2}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{t \rightarrow 1^+} g(t) = \lim_{\substack{t \rightarrow 1 \\ t > 1}} \frac{t+1}{t-1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow -\infty} g(t) &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t+1}{t-1} = \frac{-\infty}{-\infty} \stackrel{\text{FI}}{=} 1 \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t(1 + \frac{1}{t})}{t(1 - \frac{1}{t})} \stackrel{\text{Lycée}}{=} 1 \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{t}}{1 - \frac{1}{t}} = \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

**Exercice 4** Soit un générateur de force électromotrice  $E$ , de résistance interne  $r$  et le circuit ci-dessous. Déterminer la valeur de la résistance  $R$  pour que la puissance dissipée y soit maximum (on trouve  $P(R) = E^2 \cdot \frac{R}{(R+r)^2}$ )

page 39

$$P(R) = E^2 \cdot \frac{R}{(R+r)^2} \quad \mathcal{D}_P = R^* \text{ contexte Gén}$$

$$\begin{aligned} P'(R) &= E^2 \cdot \left( \frac{R}{(R+r)^2} \right)' \\ &= E^2 \cdot \frac{1 \cdot (R+r)^2 - R \cdot 2(R+r) \cdot 1}{(R+r)^4} \longrightarrow (U^2)' = 2UU' \\ &= E^2 \cdot \frac{(R+r) \cdot [R+r - 2R]}{(R+r) \cdot (R+r)^3} \quad (R+r)' = 1 \end{aligned}$$



$$P'(R) = E^2 \cdot \frac{r - R}{(R+r)^3} > 0$$

$$\begin{aligned} &> 0 \iff r - R > 0 \iff -R > -r \iff R < r \quad x(H) \text{ LO} \\ &37 \end{aligned}$$

Notes

$$R$$

$$P'(R)$$



$$\lim_{R \rightarrow 0^+} P(R) = E^2 \times \frac{0}{r^2} = 0$$

$$P(r) = E^2 \times \frac{r}{(2r)^2} = \frac{E^2 r}{4r^2} = \frac{E^2}{4r}$$

$$= \lim_{R \rightarrow +\infty} P(R) = E^2 \times \frac{\infty}{\infty} \text{ FI} = \lim_{R \rightarrow +\infty} E^2 \frac{R}{R^2} = \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{E^2}{R} = 0$$

**Exercice 4** Soit un générateur de force électromotrice  $E$ , de résistance interne  $r$  et le circuit ci-dessous. Déterminer la valeur de la résistance  $R$  pour que la puissance dissipée y soit

maximum (on trouve  $P(R) = E^2 \cdot \frac{R}{(R+r)^2}$ )

on cherche  $P'(R)$  : 
$$\left(\frac{U}{V}\right)' = \frac{U'V - UV'}{V^2}$$

$$U = R \quad U' = 1$$

$$V = (R+r)^2 \quad V' = 2(R+r)$$

$$P'(R) = \frac{E^2 \left( (R+r)(-R+r) \right)}{(R+r)(R+r)^3} = \frac{r-R}{(R+r)^3} \times E^2$$

$$E^2 > 0 \text{ car en carré}$$


$$(R+r)^3 > 0 \text{ car somme de 3 résistances}$$

Donc le signe de  $P'(R)$  dépend de  $r-R$ :

$$r-R < 0$$

$$-R < -r$$


$$R > r$$



La valeur que dois prendre  
R est  $r$  ( $R=r$ ) pour que la puissance  
dissipée soit au maximum c'est-à-dire que

$$P(r) = \frac{r}{(r+r)^2} \times E^2 = \frac{E^2 r}{4r^2} = \frac{E^2}{4r}$$

**Exercice 2** On considère le filtre passe-bas suivant :



Page 39 chapitre 3

Sa fonction de transfert a pour module :  $T = \frac{1}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}} = \left| \frac{U_1}{U_2} \right|$

- 1) Exprimer le module  $T$  en fonction de  $\Omega = \frac{\omega}{\omega_0}$  avec  $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ .
- 2) Etudier les variations et représenter graphiquement la fonction  $\Omega \mapsto T(\Omega)$  sur l'intervalle  $[0; +\infty[$ .

n°2 page -39:

①  $T = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{1}{\omega_0} - \omega)^2}}$

$$T(\Omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \Omega^2}} = (1 + \Omega^2)^{-1/2}$$


②

$$T'(\Omega) = -\frac{1}{2} (1 + \Omega^2)^{-3/2} \times 2\Omega \quad (u'(x))' = n u^{(n)-1} u'(x)$$

$$T'(\Omega) = -\frac{\Omega}{(1 + \Omega^2)^{3/2}}$$


$$\blacktriangleright \lim_{\Omega \rightarrow +\infty} T(\Omega) = \lim_{\Omega \rightarrow +\infty} (1 + \Omega^2)^{-1/2} = 0$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright T(0) &= (1 + 0)^{-1/2} \\ &= 1^{-1/2} \\ &= 1 \end{aligned}$$



Page 39 chapitre 3

Notes



Exercice 3 L'impédance d'un dipôle R, L, C sous une tension alternative de fréquence  $f$  est :

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2} \text{ avec : } \omega = 2\pi f.$$

- 1) Déterminer le signe de la dérivée de la fonction  $\omega \mapsto Z(\omega)$  sur  $\mathbb{R}^{+*}$ .
- 2) Etudier la fonction  $\omega \mapsto I(\omega) = \frac{U}{Z(\omega)}$  où  $U$  est l'amplitude constante de la tension, puis la tracer.

Page 39 chapitre 3

①  $\partial Z = IR^2$

$$Z'(\omega) = \frac{U'}{2\sqrt{U}} \text{ où } U(\omega) = R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2 \Rightarrow U'(\omega) = \left(\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2\right)' = (f^2)' = 2f \cdot f'$$


$$U'(\omega) = 2\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) \underbrace{\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)}_{= L - \frac{1}{C}(-\frac{1}{\omega^2})}$$

$$U'(\omega) = 2\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) \left(L + \frac{1}{C\omega^2}\right)$$

$$Z'(\omega) = \frac{2\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) \cdot \left(L + \frac{1}{C\omega^2}\right)}{2\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}} > 0 \Leftrightarrow L\omega - \frac{1}{C\omega} > 0$$


$$Z'(w) > 0 \Rightarrow Lw - \frac{1}{cw} > 0 \quad w > 0$$

$$\Leftrightarrow Lw > \frac{1}{cw} \Leftrightarrow Lcw^2 > 1 \Leftrightarrow w^2 > \frac{1}{LC} \Leftrightarrow w < -\sqrt{\frac{1}{LC}} \text{ ou } w > \sqrt{\frac{1}{LC}}$$




②  $w \rightarrow \mathcal{I}(w) = \frac{U}{Z(w)}$  où  $U > 0$   $\mathcal{I}'(w) = - \frac{U \cdot Z'(w)}{Z^2(w)}$  est donc

de signe opposé à celui de  $Z'(w)$ .



$$\lim_{w \rightarrow 0^+} \mathcal{I}(w) = \lim_{w \rightarrow 0^+} \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Lw - \frac{1}{cw})^2}} = 0$$


$$\mathcal{I}\left(\frac{1}{\sqrt{LC}}\right) = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{L}{\sqrt{LC}} - \frac{1}{c\sqrt{LC}}\right)^2}} = \frac{U}{R}$$



$I'(\frac{1}{\sqrt{LC}}) = 0 \Rightarrow$  tangente horizontale en  $\frac{1}{\sqrt{LC}}$

Page 39 chapitre 3

asymptote horizontale en  $+\infty$ , d'équation  $y = 0$



## Partie B : Calcul de limites

Page 26 chapitre 3

Formes indéterminées FI Soit  $x_0$ , un nombre réel ou  $\pm\infty$ .

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty$$

$$0^0, \infty^0, 1^\infty$$

Remarque  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \exp(g(x) \cdot \ln(f(x)))$  cette écriture permet de « lever » les formes indéterminées suivantes : "L<sup>∞</sup>", "0<sup>0</sup>" et " $\infty^0$ "

Voici quelques techniques permettant de « lever » une forme indéterminée :

## Technique 1 : Croissance comparée

**Définition** Soit  $x_0$  un réel ou  $\pm\infty$ . On dit que la fonction  $f$  est négligeable devant  $x$  lorsque

**fonction g en  $x_0$  lorsque :  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ . On note alors :  $f(x) \ll g(x)$**

**Théorèmes** Soient :  $0 < \alpha < \beta$

$$\ln(x) \underset{\infty}{\ll} x^\alpha \underset{\infty}{\ll} x^\beta \underset{\infty}{\ll} e^x$$

"est négligeable devant... en +oo"

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^3} = 0$$

Exemples : Calculer  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  où  $f(x) = x.e^x - x^2$

$x \rightarrow \infty$  "  $+\infty - \infty$ "

$x \ll e^x$  donc  $x^2 \ll xe^x$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

Calculer  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  où  $f(x) = \frac{\ln(4x)}{x}$

$$\begin{aligned}\ln(x^\alpha) &= \alpha \ln x \\ \ln(A \times B) &= \ln A + \ln B\end{aligned}$$

(FI) "∞" / "∞"

$$f(x) = \frac{\ln 4 + \ln x}{x} = \frac{\ln 4}{x} + \frac{\ln x}{x}$$

Comme  $\ln x \ll x$  donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

Alors  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

## Technique 2 : Expression conjuguée

Exemples : Calculer  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  où  $f(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x}$

$$(A - B)(\overline{A + B}) = A^2 - B^2$$

conjugué de  $A - B$ .

Page 27 chapitre 3

FI "0"

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x} \times \frac{\sqrt{1+x^2} + 1}{\sqrt{1+x^2} + 1} = \frac{1+x^2 - 1}{x(\sqrt{1+x^2} + 1)} = \frac{x^2}{x(\sqrt{1+x^2} + 1)}$$

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2} + 1} \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{0}{2} = 0$$

Calculer  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  où  $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 3x - 3} - x}{x - 1}$

$$\text{FI "0". } f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 3x - 3} - x}{x - 1} \times \frac{\sqrt{x^2 + 3x - 3} + x}{\sqrt{x^2 + 3x - 3} + x} = \frac{x^2 + 3x - 3 - x^2}{(x-1)(\sqrt{x^2 + 3x - 3} + x)}$$

$$f(x) = \frac{3x - 3}{(x-1)(\sqrt{x^2 + 3x - 3} + x)} = \frac{3}{\sqrt{x^2 + 3x - 3} + x} \text{ et } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{3}{2}$$

### Technique 3 : Théorèmes de comparaison

Soient  $f$ ,  $g$  et  $h$  trois fonctions définies sur  $[a, b[$  où  $b$  est un réel ou  $\pm\infty$

Page 27 chapitre 3

1) Si  $\forall x \in [a, b[$   $f(x) \leq g(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = -\infty$ , alors  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = -\infty$

2) Si  $\forall x \in [a, b[$   $f(x) \geq g(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = \infty$ , alors  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$

3) Si  $\forall x \in [a, b[$   $|f(x)| \leq g(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = 0$ , alors  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = 0$

4) Si  $\forall x \in [a, b[$   $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow b^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = L$ , alors  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = L$  (théorème des gendarmes)

Exemples : Calculer  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  où  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

On sait que  $-1 \leq \sin x \leq 1$   
 $-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$   $\rightarrow \frac{1}{x} > 0$  car  $x \rightarrow +\infty$ .

Comme  $\lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ , alors d'après le th des Gendarmes  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

## Technique 4 : Equivalence

Page 29 chapitre 2

**Définition** Soit  $x_0$  un réel ou  $\pm\infty$ . On dit que la fonction  $f$  est équivalente à la fonction  $g$  au voisinage de  $x_0$  si  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ .


en  $x_0$  lorsque :  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ . On note alors :  $f(x) \sim g(x)$  "f est équivalente à g en  $x_0$ "

Exemples : Montrer que les fonctions  $f$  et  $g$  suivantes sont équivalentes en  $\infty$  :


$$f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \text{ et } g(x) = \frac{e^x}{2} : \quad \text{FI} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x} \stackrel{\downarrow}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{e^x}{e^x} + \frac{e^{-x}}{e^x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 + e^{-2x} \right) = 1$$

$$\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$$



... donc ...  $f(x) \underset{+ \infty}{\sim} g(x)$ .




\* Chercher un équivalent de  $f$  en  $\infty$  où  $f(x) = 7x^3 - 3x^2 + 2$

$$g(x) = 7x^3$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 - 3x^2 + 2}{7x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \underbrace{\frac{7x^3}{7x^3} - \frac{3x^2}{7x^3} + \frac{2}{7x^3}}_{1 - \frac{3}{7x} + \frac{2}{7x^3}} \right) = 1$$

donc  $\boxed{7x^3 - 3x^2 + 2 \underset{+ \infty}{\sim} 7x^3}$

\*  $7x^3 - 4x \underset{+0}{\sim} -4x$ . Car :  $\frac{7x^3 - 4x}{-4x} = \frac{7x^2}{-4} + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$



Ne pas oublier ~~le~~ coefficient !



Tout polynôme est équivalent en  $\pm\infty$  à son terme de plus haut degré.  
Tout polynôme est équivalent en 0 à son terme de plus bas degré.



$$f(x) \underset{x_0}{\sim} f(0) + x \cdot f'(0)$$

Page 29 chapitre 2

Si  $f$  est dérivable en  $x_0$ , alors :  $f(x) \underset{x_0}{\sim} f(x_0) + (x - x_0) \cdot f'(x_0)$



équation de la tangente à  $E_f$  en  $x_0$

Compléter :





$$\sin(x) \underset{0}{\sim} \cancel{\sin 0} + x \cdot \cancel{\sin' 0} \quad \text{donc} \quad \boxed{\sin x \underset{0}{\sim} x} \quad (\sin(0,045) \simeq 0,045)$$

$$e^x \underset{0}{\sim} \cancel{e^0} + x \cdot \cancel{e^0} \quad \text{donc} \quad \boxed{e^x \underset{0}{\sim} 1+x}$$

$$\ln(1+x) \underset{0}{\sim} \cancel{\ln(1+0)} + x \cdot \cancel{\frac{1}{1+0}} \quad \text{donc} \quad \boxed{\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x}$$

$$\text{ou } (\ln u)' = \frac{u'}{u} \Rightarrow (\ln(1+x))' = \frac{1}{1+x}$$

$$\sqrt{1+x} \underset{0}{\sim} \cancel{\sqrt{1+0}} + x \cdot \cancel{\frac{1}{2\sqrt{1+0}}} \quad \text{donc} \quad \boxed{\sqrt{1+x} \underset{0}{\sim} 1 + \frac{1}{2}x}$$



## Applications en physique :

### Le pendule pesant


- Equation en  $\theta$
- Mise en équation :

$$\ddot{\theta} + k\dot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

- Equation différentielle :
  - Non linéaire !
  - Résolution analytique compliquée
- Solutions possibles :
  - Si  $\theta$  petit alors  $\sin \theta \simeq \theta$  : oscillateur harmonique

$$\ddot{\theta} + k\dot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

- Résolution numérique



$$(1+x)^\alpha \underset{0}{\sim} (1+0)^\alpha + x \cdot \alpha \cdot (1+0)^{\alpha-1} \quad \text{donc } (1+x)^\alpha \underset{0}{\sim} 1 + \alpha x. \quad \text{Page 30 chapitre 2}$$

$$((1+x)^\alpha)' = \alpha \cdot 1 \cdot (1+x)^{\alpha-1} \quad (U^\alpha)' = \alpha U' U^{\alpha-1}$$

$$\tan(x) \underset{0}{\sim} \tan 0 + x \cdot \frac{1}{\cos^2 0} \quad \text{donc } \tan x \underset{0}{\sim} x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x.$$

$$f(x) \underset{0}{\sim} f(0) + x \cdot f'(0)$$

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2} \underset{0}{\sim} 1 + \frac{1}{2}x.$$

$$\cos(x) \underset{0}{\sim} \cos 0 + x \cdot (-\sin 0) \quad \text{donc } \cos x \underset{0}{\sim} 1$$

Si  $f$  est 2 fois dérivable en  $x_0$ , alors :  $f(x) \underset{x_0}{\sim} f(x_0) + (x - x_0).f'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2}.f''(x_0)$

équation de la tangente en 0.


dérivée seconde.

$$f(x) \underset{0}{\sim} f(0) + x f'(0) + \frac{x^2}{2} f''(0)$$


$$\cos(x) \underset{0}{\sim} 1 + x \times 0 + \frac{x^2}{2} (-1) \quad \text{dans} \quad \cos x \underset{0}{\sim} 1 - \frac{x^2}{2}$$

$$f(x) = \cos x \quad f'(x) = -\sin x \quad f''(x) = -\cos x$$

$$f''(x) = (-\sin x)'$$



$$\cos(x) \underset{0}{\sim} 1 - \frac{x^2}{2}$$



## Opérations

- Soient  $f_1, g_1, f_2, g_2$  quatre fonctions et  $x_0$  un réel ou  $\pm\infty$ .

$$\text{Si } \begin{cases} f_1 \underset{x_0}{\sim} g_1 \\ \text{et} \end{cases} \text{ alors } \begin{cases} f_1 \cdot f_2 \underset{x_0}{\sim} g_1 \cdot g_2 \\ \text{et} \\ \frac{f_1}{f_2} \underset{x_0}{\sim} \frac{g_1}{g_2} \end{cases}$$

(pour le quotient,  $f_2$  et  $g_2$  ne s'annule pas pour  $x$  voisin de  $x_0$  sauf peut-être en  $x_0$ )

-  $f, g, h$  sont trois fonctions,

$$\text{Si } f(X) \underset{X_0}{\sim} g(X) \text{ et } \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = X_0, \text{ alors } f(h(x)) \underset{x_0}{\sim} g(h(x))$$

Exemples :

Compléter :  $f(x) = \frac{-x^7 + 3x^2}{x(x-1)^3} \underset{x \rightarrow \infty}{\sim} \frac{-x^7}{x \cdot x^3} = \frac{-x^7}{x^4} = -x^3$

donc  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (-x^3) = -\infty$

$$e^{\sqrt{x}} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} ??$$

On sait que  $e^x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1+x$  page 29.

On pose  $X = \sqrt{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

Alors  $e^{\sqrt{x}} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1 + \sqrt{x}$

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} ??$$

On sait  $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$  page 29.] Alors  $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x}$ .  
 On pose  $X = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

**Théorème** Soient  $f, g$  deux fonctions et  $x_0$  un réel ou  $\pm\infty$ .

Si  $f(x) \sim g(x)$  alors  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$

Exemples : Calculer  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  où  $f(x) = \frac{(1-x)^7 \cdot (x+1)}{(x^3 + 2x^2 - 1) \cdot (3x^2 - 1)^2}$

$$\text{FI} \quad \frac{\infty}{\infty} \quad f(x) \underset{+ \infty}{\sim} \frac{(-x)^3 \cdot x}{x^3 \cdot (3x^2)^2} = \frac{(-x)^3}{x^2 \cdot (3x^2)^2} = \frac{-x^3}{x^2 \cdot 9x^4} = \frac{-x^3}{9x^6}$$

$$\text{done } f(x) \underset{+ \infty}{\sim} \frac{-x}{9} = g(x)$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( -\frac{x}{3} \right) = -\infty$$

\* Calculer  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  où  $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{\tan(x)}$

FI "0" / 0

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{x} = 1$$

done  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

page 29

\*  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  où  $f(x) = \frac{\ln(1+2x)}{\tan(3x)}$

FI "0" / 0

$$\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \quad \text{On pose } X=2x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \quad \text{done } \ln(1+2x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 2x$$

$$\tan x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \quad \text{On pose } X=3x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \quad \text{done } \tan(3x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 3x$$

done  $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$  et  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{2}{3}$

Notes  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

"1<sup>∞</sup>"

(FI)

$$A^\alpha = \exp(\ln A^\alpha) = e^{\ln(A^\alpha)} = e^{\alpha \ln A} ; \quad A > 0$$

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e^{x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}$$

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x} \quad (\text{page 30})$$

$$x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x \cdot \frac{1}{x} = 1 \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \hat{e} = e.$$

Notes

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0} \text{ FI} \quad f(x_0) = g(x_0) = 0.$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} \underset{x_0}{\sim} \frac{f(x_0) + (x-x_0) \cdot f'(x_0)}{g(x_0) + (x-x_0) g'(x_0)} = \frac{(x-x_0) f'(x_0)}{(x-x_0) g'(x_0)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$

## Technique 5 : Théorème de l'Hospital

Page 32 chapitre 2

Si  $f$  et  $g$  sont deux fonctions dérivables sur  $]a, x_0[$ , dont la limite en  $x_0$  est nulle ou infinie, si  $g'(x)$  ne s'annule pas sur  $]a, x_0[$ , et si la limite :  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  existe, alors :  $\textcircled{FI}$  "0" ou " $\infty$ "

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Exemples :

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x^2 + 3x} = \frac{\textcircled{0}}{\textcircled{0}} \textcircled{FI} \quad \text{Règle de l'Hospital: } L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)'}{(x^2 + 3x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2x + 3}$$

..... donc  $L = \frac{1}{3}$

(autre méthode :  $\frac{\sin x}{x^2 + 3x} \underset{\textcircled{0}}{\sim} \frac{x}{3x} = \frac{1}{3}$  donc  $L = \frac{1}{3}$ )

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{\ln(x)} = \frac{\infty}{\infty}$  (FI) Règle de l'Hospital :  $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x})'}{(\ln x)'} =$

Page 32 chapitre 2

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x} \cdot \sqrt{x}}{2} = +\infty.$$

(autre méthode :  $\ln x \ll \sqrt{x}$  donc  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{\ln x} = +\infty$ )

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) - 1}{x^3 + 5x^2} = \frac{\text{"0" (FI)}}{\text{"0" (FI)}} \quad \text{Règle de l'Hospital:} \quad \text{Page 33 chapitre 2}$$

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin(2x)}{3x^2 + 10x} = \frac{\text{"0" (FI)}}{\text{"0" (FI)}} \quad \text{Règle de l'Hospital:}$$

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4 \cos(2x)}{6x + 10} = \frac{-4}{10} = -\frac{2}{5} \quad \begin{aligned} (-2 \sin(2x))' &= -2 (\sin(2x))' \\ &= -2 \cdot 2 \cdot \cos(2x) \end{aligned}$$

(autre méthode: ....)

$$\frac{\cos(2x) - 1}{x^3 + 5x^2} \underset{0}{\sim} \frac{1 - \frac{(2x)^2}{2} - 1}{5x^2} = \frac{-2x^2}{5x^2} = -\frac{2}{5} \quad \text{donc } L = -\frac{2}{5}$$

$$\cos x \underset{0}{\sim} 1 - \frac{x^2}{2} \quad \text{page ...}$$

$$X = 2x \xrightarrow{x \rightarrow 0}$$

**Exercice 5** Calculer la limite des fonctions suivantes au « point » a donné.

1)  $f(x) = \frac{(x^4 - 1)(x^2 + 3)}{2x(x^3 - 2)(x^2 + 2)}$  a =  $\infty$   $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) =$

2)  $g(x) = \frac{(x^7 - 2x)(x - 4)}{(x^6 - 2x)(x^3 - x)}$  a =  $\infty$   $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) =$

3)  $h(x) = \frac{x^6 - 3x^4 + 1}{(x + 1)(x^4 + 3)}$  a =  $\infty$   $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) =$

4)  $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^3 - 1}$  a = 1  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) =$

5)  $f(x) = \frac{x^3 + \sqrt{x - 1}}{\sqrt{x} - 2}$  a =  $\infty$   $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) =$

6)  $f(x) = \frac{\sqrt{x + 1} - 2}{x - 3}$  a = 3  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) =$

Page 40 chapitre 3

7)  $f(x) = \frac{3x^5 \cdot \sin(5x^4)}{(3x^2 + 2x)^4 \cdot \ln(1+2x)}$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$

$$1) f(x) = \frac{(x^4 - 1)(x^2 + 3)}{2x(x^3 - 2)(x^2 + 2)}$$

$a = \infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\infty}{\infty} \text{ FI.}$$

$$* f(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{x^4 \times x^2}{2x \times x^3 \times x^2} = \frac{x^6}{2x^6} \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}.$$

$$* \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{\pm \infty}{\pm \infty} \text{ FI}$$

$$\frac{3}{8 \times 10,000} = \frac{3}{8} \cdot 1000$$

$$f(x) \underset{-\infty}{\sim} \frac{1}{2} \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{1}{2}.$$

$$* \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{-3}{-8x} \begin{cases} \xrightarrow{0^+} +\infty \\ \xrightarrow{0^-} -\infty \end{cases}.$$

$$f(x) \underset{0}{\sim} \frac{(-1) \times 3}{2x \times (-2) \times 2} = \frac{-3}{-8x} = \frac{3}{8x}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{8x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{8x} = -\infty \end{aligned}$$

2)  $g(x) = \frac{(x^7 - 2x)(x - 4)}{(x^6 - 2x)(x^3 - x)}$   $a = \infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{\infty}{\infty}$

$$g(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{x^7 \cdot x}{x^6 \cdot x^3} = \frac{x^8}{x^9} = \frac{1}{x}$$

done  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$

$$3) h(x) = \frac{x^6 - 3x^4 + 1}{(x+1)(x^4 + 3)} \quad a = \infty$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \frac{"\infty"}{\infty}$ . **(FI)**.

$$h(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{x^6}{x \times x^4} = \frac{x^6}{x^5} = x \quad \text{done} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty.$$

$$\text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = h(0) = \frac{1}{3}.$$

$$4) \quad f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^3 - 1} \quad a=1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{0}{0} \quad \text{FI}$$

$$\underline{g(x) = x^2 + 2x - 3} \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \underbrace{g(1)}_0 + \underbrace{g'(1) \cdot (x-1)}_{4} = \frac{4(x-1)}{g'(x) = 2x+2}$$

$$\underline{h(x) = x^3 - 1} \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \underbrace{h(1)}_0 + \underbrace{h'(1) \cdot (x-1)}_3 = \frac{3(x-1)}{h'(x) = 3x^2}$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \frac{4(x-1)}{3(x-1)} = \frac{4}{3} \quad \text{done} \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{4}{3}.$$

$$5) f(x) = \frac{x^3 + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x-2}} \quad a=\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\frac{5}{2} = 2.5.$$

$$f(x) \underset{\infty}{\sim} \frac{x^3}{x^{1/2}} = x^{3 - \frac{1}{2}} = x^2 \sqrt{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty.$$

$$6) f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x-3} \quad a=3$$

expression conjuguée

✓

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \frac{\text{"O" }}{0}$$

$$(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$$

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x-3} \times \frac{\sqrt{x+1} + 2}{\sqrt{x+1} + 2} = \frac{\sqrt{x+1} - 2}{(x-3)(\sqrt{x+1} + 2)} = \frac{x+1-4}{(x-3)(\sqrt{x+1} + 2)}$$

$$f(x) = \frac{\cancel{x-3}}{(x-3)(\sqrt{x+1} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 2} = \frac{1}{\sqrt{3+1} + 2} = \frac{1}{2}$$

Puis faire le 2<sup>e</sup> exemple page 27.

$$7) f(x) = \frac{3x^5 \cdot \sin(5x^4)}{(3x^2 + 2x)^4 \cdot \ln(1+2x)} \quad a=0$$

Ex 5 - page 40.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{0}{0} \text{ (FI)}$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{3x^5 \cdot 5x^4}{(2x)^4 \cdot 2x} = \frac{15x^9}{32x^5} = \frac{15x^4}{32}$$

$$\begin{aligned} \sin(5x^4) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} 5x^4 & \text{ca: } \sin x &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ X = 5x^4 &\rightarrow 0 & X = 2x &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$(2x)^4 = 2^4 x^4 = 16x^4$$

$$\begin{aligned} \ln(1+2x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} 2x & \ln(1+x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ X = 2x &\rightarrow 0 & X = x &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$\text{Dann } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{15x^4}{32} = 0$$

## Partie C : Fonctions réciproques de $\exp$ et $\tan$

Page 34 chapitre 3

### Introduction

**Une fonction  $f$  est définie sur  $D$ , un sous-ensemble de  $\mathbb{R}$ , si à tout  $x$  de  $D$  on peut associer un unique nombre noté  $f(x)$ , et appelé image de  $x$  par  $f$ .**

**On écrit** 
$$\begin{array}{ccc} f : D & \xrightarrow{\hspace{2cm}} & f(D) \\ x & \longmapsto & y = f(x) \end{array}$$

**$D$  est appelé l'ensemble de définition de  $f$ , et  $f(D)$  l'ensemble image de  $D$  par  $f$ .**

Peut-on déduire de  $f$  une fonction  $g$ , définie de la façon suivante ?

$$\begin{array}{ccc} g : f(D) & \xrightarrow{\hspace{2cm}} & D \\ y & \longmapsto & x / y = f(x) \end{array}$$

La réponse est oui, à condition que la fonction  $f$  soit bijective sur  $D$ .

## I. Fonction bijective

### Notes

#### 1) Définition

On appelle fonction bijective sur D, toute fonction  $f : D \rightarrow f(D)$

$$x \mapsto y = f(x)$$

"unique"

vérifiant :


$\forall y \in f(D) \exists ! x \in D / y = f(x)$ , c'est-à-dire :

"Pour tout" "il existe" "tel que"

« Pour tout  $y$ , élément de  $f(D)$ , il existe un unique  $x$ , élément de  $D$  tel que  $y=f(x)$  »

#### Exemples


✓ La fonction carré est-elle bijective sur  $\mathbb{R}$  ? sur  $[0 ; +\infty[$  ?



$f : \mathbb{R} \rightarrow f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+$  n'est pas bijective car  $y=1$  a deux antécédents

$$x \mapsto y = f(x) = x^2 \quad x = -1 \text{ et } x = 1.$$

$f_{| \mathbb{R}_+} : \mathbb{R}_+ \rightarrow f(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$  est bijective...




$y = \tan x$

✓ Déterminer un intervalle sur lequel la fonction tangente est bijective.

$f : \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$  n'est pas bijective

$$x \mapsto \tan x$$

car  $f$  est  $\pi$ -périodique.



## 2) Théorème

1 sens de variation



Toute fonction continue et strictement monotone sur  $D$  est bijective sur  $D$ .



Exemple La fonction exponentielle est-elle bijective sur son ensemble de définition ?

Pourquoi ?

$$f = \exp : \mathbb{R} \xrightarrow{u} f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+^* = ]0, +\infty[$$


$$x \xrightarrow{u} y = e^x = f(x)$$

$f = \exp$  est strictement croissante et continue, elle est donc bijective. Elle admet donc une fonction réciproque :

$$f^{-1} : \mathbb{R}_+^* \xrightarrow{u} \mathbb{R}$$


$$y \xrightarrow{f^{-1}} x / y = e^x \Leftrightarrow x = \ln y = f^{-1}(y)$$

$$f'(f(x)) = \ln(e^x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad f(f^{-1}(y)) = e^{\ln y} = y \quad \forall y \in \mathbb{R}_+^*$$



Notes

page 37



## II. Fonction réciproque

### 1) Définition

**Définition/Théorème** Soit une fonction bijective  $f : D \longrightarrow f(D)$   
 $x \longmapsto y = f(x)$

il existe alors une fonction notée  $f^{-1}$  et appelée « fonction réciproque de  $f$  »,  
telle que :  $f^{-1} : f(D) \longrightarrow D$

$y \longmapsto x = f^{-1}(y)$

Remarques :  $\forall x \in D, (f^{-1} \circ f)(x) = x$  et  $\forall y \in f(D), (f \circ f^{-1})(y) = y$

Les courbes représentant  $f$  et  $f^{-1}$  sont symétriques l'une de l'autre par rapport à la droite  $y = x$ .

On appelle fonction tangente restreinte à l'intervalle  $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ , la fonction définie par :

$\tan: \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[ \rightarrow \mathbb{R}$

$x \longmapsto y = \tan(x)$

P.38

Cette fonction est strictement croissante et continue, elle est donc bijective et admet alors une fonction réciproque notée Arctan et appelée Arctangente, définie par :

Arctan :  $\mathbb{R} \rightarrow \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$

$y \longmapsto x = \text{Arctan}(y)$  tel que  $y = \tan(x)$

Arctan est une fonction continue et strictement croissante.

$$\tan(\text{Arctan}(x)) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{Arctan}(\tan(x)) = x \quad \forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$$

Notes

Dérivée de  $\text{Arctan}$  ?

$$(\tan(\underbrace{\text{Arctan}x}_u))' = (x)' \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(\tan u)' = u' \cdot (1 + \tan^2 u)$$

$$(\text{Arctan}x)' \times \underbrace{(1 + \tan^2(\text{Arctan}x))}_{= x^2 \text{ car } \tan^2(\text{Arctan}x) = (\tan(\text{Arctan}x))^2} = 1$$

$$(\text{Arctan}x)' \times (1 + x^2) = 1$$

$$\text{O} \quad (\text{Arctan}x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{O}.$$

On appelle fonction tangente restreinte à l'intervalle  $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ , la fonction définie par :

$$\tan: \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[ \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto y = \tan(x)$$

P.38

Cette fonction est strictement croissante et continue, elle est donc bijective et admet alors une fonction réciproque notée Arctan et appelée Arctangente, définie par :

$$\text{Arctan}: \mathbb{R} \longrightarrow \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$$

$$y \longmapsto x = \text{Arctan}(y) \text{ tel que } y = \tan(x)$$

Arctan est une fonction continue et strictement croissante.

$$\tan(\text{Arctan}(x)) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{Arctan}(\tan(x)) = x \quad \forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$$

$$\frac{d}{dx}(\text{Arctan}(x)) = \frac{1}{1+x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Note

